QUESTÕES DISCURSIVAS

01. A causa mais frequente de dificuldades respiratórias nos consultórios odontológicos é a ansiedade que se manifesta como hiperventilação. Considere a situação na qual um cirurgião-dentista se depara com um episódio de hiperventilação em um paciente com 15 anos de idade, apresentando sintomas de alcalose, durante a realização de um procedimento cirúrgico. Redija um texto de, no máximo, 20 linhas descrevendo as etapas sequenciais do tratamento da síndrome de hiperventilação.

02. O uso de ansiolíticos ou sedativos tem provado ser benéfico em crianças hiperativas ou rebeldes. Quando indicados, eles devem ser usados mais como complemento do que como substitutos das abordagens ou técnicas tradicionais para o controle do comportamento. Atualmente, o midazolam (benzodiazepínico) vem sendo prescrito com certa frequência na clínica odontopediátrica. Qual é a dosagem máxima, segura, para uma criança de 15 kg, não cooperadora, e o tempo de antecedência para que esse medicamento seja administrado?

03. Considerando os regimes profiláticos recomendados pela *American Heart Association* para a profilaxia de endocardite infecciosa em crianças, redija uma prescrição de antibiótico para uma criança de 12 kg, não alérgica às penicilinas, e outra prescrição, considerando que essa criança é alérgica às penicilinas.

04. Na inexistência de uma balança ou da informação precisa dos responsáveis, um cálculo de peso aproximado de uma criança com biótipo normal pode ser realizado. Valendo-se da fórmula matemática, descrita por Andrade (2014), calcule o peso aproximado de uma criança de 8 anos de idade e prescreva o medicamento ibuprofeno 50 mg/ml, solução oral “gotas”, para o controle de dor pós-operatória desse paciente.