

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES DE 01 A 20

01. Sobre a contração de polimerização, considerada uma das mais sérias limitações das resinas compostas, é INCORRETO afirmar que existe a possibilidade de:
- a) gerar stress interno na restauração.
 - b) causar a formação de fendas junto à parede gengival nas classes II e V.
 - c) ser reduzida através do uso de uma técnica incremental.
 - d) produzir infiltração marginal, salvo quando a restauração está contida em esmalte.
02. Ao realizar-se uma extração de um molar superior, um fragmento radicular é deslocado para o interior do seio maxilar. Com base nessa informação, assinale as afirmativas abaixo como verdadeira(s) ou falsa(s).
- () O tamanho do fragmento radicular não é importante para o tratamento.
 - () O fato de o dente ser portador ou não de processo infeccioso tem relevância.
 - () Num paciente com seio maxilar hígido é mais fácil o controle da raiz deslocada.
 - () No caso de o dente não estar infectado e o fragmento ser pequeno (2 a 3 mm), não se deve insistir muito na remoção da raiz.
- A sequência CORRETA é:
- a) V,V,V,F.
 - b) F,V,V,V.
 - c) F,F,V,F.
 - d) V,V,F,V.
03. Assinale a afirmativa que NÃO se caracteriza como uma vantagem do emprego de restaurações de resinas quando comparadas às restaurações metálicas:
- a) Apresentar propriedades mecânicas próximas às da dentina, como, por exemplo, o módulo de elasticidade e resiliência.
 - b) Possuir capacidade de se unir efetivamente aos tecidos dentais, através da formação da camada híbrida, de maneira semelhante à junção amelo-dentinária.
 - c) Possibilitar restaurações volumosas pela técnica direta, haja vista que o sucesso dessas restaurações está associado à habilidade do profissional, e não ao tamanho da mesma.
 - d) Possibilitar maior preservação de tecido dentário, uma vez que a extensão preventiva e a configuração retentiva são dispensadas.
04. Com relação ao atendimento a um paciente diabético, que será submetido à exodontia do 35, é um procedimento INCORRETO:
- a) Atender o paciente com nível glicêmico não controlado apenas nos casos de urgência.
 - b) Tratar agressivamente as infecções.
 - c) Suspender o uso de hipoglicemiantes orais no dia da cirurgia.
 - d) Estar atento para os sinais de hipoglicemia.
05. Com relação ao uso de anestésicos locais em odontologia, é INCORRETO afirmar que:
- a) todos os sais anestésicos possuem ação vasodilatadora.
 - b) o risco de toxicidade é maior nas soluções sem associação com vasoconstritor.
 - c) a presença de vasoconstritor aumenta o tempo de duração da anestesia.
 - d) a hemostasia não tem relação direta com o uso de vasoconstritores.

06. NÃO é fator que dificulta uma exodontia:

- a) Divergência radicular em dentes com duas ou mais raízes.
- b) Presença de grandes restaurações de amálgama no dente e nos dentes vizinhos.
- c) Proximidade do canal alveolar inferior em molares inferiores.
- d) Dente com mobilidade aumentada.

07. Sobre o uso de antibióticos por via sistêmica em odontologia, é INCORRETO afirmar que:

- a) na presença de abscesso, reduzido, crônico e bem localizado não está indicada a antibioticoterapia.
- b) em culturas positivas de um canal radicular, existe indicação para o uso de antibióticos com a finalidade de esterilização dos mesmos.
- c) na presença de infecção de início agudo com tumefação difusa e dor de moderada a intensa, espera-se uma resposta rápida e efetiva com o uso de antibióticos.
- d) em pacientes com pulpite, que apresentam dor intensa, não se usa antibióticos.

08. A radiografia é um exame complementar amplamente usado em odontologia com a finalidade de auxiliar o diagnóstico. Este exame alia-se ao exame clínico, mas não o substitui.

Com relação ao exame radiográfico, é INCORRETO afirmar que ele permite:

- a) verificar a presença de lâmina dura interdental embora sua ausência não caracterize estado patológico.
- b) perceber a relação coroa/restauração possibilitando detectar iatrogenias.
- c) visualizar o osso alveolar, registrando seu nível em relação aos dentes.
- d) mostrar perdas teciduais tais como cáries, reabsorções dentinárias e reabsorções radiculares.

09. Com relação à periodontite necrosante (GUNA), é INCORRETO afirmar que:

- a) está associada a baixo padrão de higiene oral.
- b) tem o tabagismo como fator predisponente.
- c) evita-se realizar raspagens gengivais na primeira consulta.
- d) pode ser desencadeada por fatores psicológicos, tais como estresse e depressão.

10. Ao atender um paciente portador de *angina pectoris* é necessário que se tome alguns cuidados especiais.

Assinale a alternativa que apresenta um procedimento INCORRETO realizado durante o atendimento:

- a) Reduzir a ansiedade usando fármacos de ação hipnótica na noite anterior.
- b) Evitar o uso de anestésicos com vasoconstritores.
- c) Considerar a possibilidade de utilização de comprimidos ou spray de nitroglicerina.
- d) Considerar o uso de óxido nitroso.

11. Com relação às restaurações em resina classe III, é INCORRETO afirmar que:

- a) a via de acesso preferencial deve ser a palatina.
- b) a forma de contorno deve ser determinada pelo tamanho e formato da lesão cariada.
- c) o esmalte vestibular deve estar sempre apoiado em dentina sadia.
- d) a técnica de condicionamento ácido simplificou os preparos dessas restaurações.

12. Leia as afirmativas abaixo referentes ao preparo de cavidade para amálgama classe I, na superfície oclusal:

- I. O contorno deve ser estendido para incluir as fissuras cariadas e/ou muito profundas, levando as margens até o tecido dentário relativamente liso e sadio.
- II. Quando duas cavidades oclusais estiverem separadas por uma frágil parede (menos de 0,5 mm de espessura), elas devem ser unidas através de um só contorno.
- III. O contorno deve ser estendido para incluir esmalte socavado por cárie.
- IV. As margens vestibulares e linguais não devem ser estendidas mais que a metade da distância entre o sulco central e a ponta das cúspides correspondentes.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I e IV, apenas.

13. Um paciente de 20 anos relata dor na região posterior esquerda da mandíbula. Afirma que a dor é pulsátil, persistente e irradia para o ouvido, assoalho bucal e garganta. Ao exame clínico, constata-se a presença de inflamação do tecido pericoronar em 3º molar parcialmente eruído, com acentuada hiperemia e enfartamento de gânglios submandibulares.

Neste caso, no primeiro atendimento, é INCORRETO:

- a) fazer assepsia da região.
- b) prescrever antibióticos.
- c) remover o capuz gengival.
- d) irrigar a região com peróxido de hidrogênio.

14. A felipressina, vasoconstritor contido em soluções anestésicas de uso local, não pertence ao grupo das aminas simpaticomiméticas (epinefrina, norepinefrina, fenilefrina), não agindo, portanto, nos receptores alfa e beta adrenérgicos.

Com relação à felipressina, assinale a afirmativa CORRETA:

- a) Ela não provoca efeitos no sistema cardiovascular.
- b) Em pacientes portadores de hipertensão essencial, pode-se usá-la num limite de três tubetes numa mesma sessão.
- c) Como todo vasoconstritor, ela facilita procedimentos cirúrgicos, agindo de forma acentuada no controle da hemostasia.
- d) Ela atua de forma idêntica na microcirculação venosa e arteriolar.

15. Em relação aos princípios que regem um preparo cavitário para *inlays/onlays* estéticos, é INCORRETO afirmar que esse preparo deve:

- a) ser sempre expulsivo.
- b) ter ausência de chanfrado nos terminos externos.
- c) ter ângulos internos arredondados.
- d) ter espessura mínima de 2.5 mm em áreas de carga (cúspides de contenção cêntrica e fossa/crista).

16. A maior frequência de traumatismo dentário ocorre em incisivos centrais superiores, e são mais comuns na dentição permanente. Analise as afirmativas abaixo relativas a traumatismo dentário.

- I. Quando ocorre exposição pulpar, o sucesso do tratamento depende do tamanho da exposição, do tempo em que a polpa ficou exposta ao meio bucal, da idade do paciente, da idade do dente e da sintomatologia dolorosa.
- II. Quando houver invasão do espaço biológico, onde se inserem as estruturas periodontais, deve-se planejar um procedimento prévio à restauração definitiva, a fim de restabelecer a relação de harmonia entre o dente e o periodonto.
- III. Quando compromete o periodonto e o alvéolo, o tratamento deve ser orientado, inicialmente a estas estruturas, uma vez que a manutenção do dente é prioritária à restauração da parte fraturada.
- IV. Dentre os fatores que dificultam a restauração imediata do dente estão a ansiedade do paciente, o quadro pulpar e periodontal, que podem não estar definidos no momento, e também o fato de ser um atendimento de emergência em que não se dispõe de tempo suficiente para alcançar um bom resultado.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I e III, apenas.
- b) II e IV, apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) I, III e IV, apenas.

17. NÃO é característica de um quadro de necrose pulpar:

- a) História clínica com um quadro de pulpíte anterior ou lesão traumática.
- b) Presença de dor à percussão.
- c) Teste de vitalidade pulpar negativo.
- d) Presença de grande sensibilidade ao frio em todos os casos.

18. O emprego de antibióticos na clínica odontológica está indicado em duas situações totalmente distintas: na prevenção ou no tratamento das infecções. Sobre o uso de antibióticos, é INCORRETO afirmar que:

- a) cerca de 10 a 15% dos pacientes alérgicos às penicilinas podem também apresentar alergia às cefalosporinas.
- b) as reações alérgicas são mais comuns quando os antibióticos são ministrados por via injetável.
- c) o metronidazol é eficaz em odontologia, embora não possa ser associado às penicilinas.
- d) o uso profilático de antibióticos é recomendado em pacientes que apresentam cardiopatias.

19. Em dentes posteriores, têm-se realizado restaurações de resina composta pela técnica direta com bastante sucesso. Algumas vezes há necessidade de indicação de uma restauração em resina composta confeccionada pela técnica indireta.

Com relação às resinas confeccionadas de forma indireta, assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) Obtém-se uma melhor adaptação após a cimentação da restauração.
- b) Podem substituir cúspides fraturadas ou destruídas.
- c) Possuem maior longevidade que as realizadas de forma direta.
- d) Devem ser realizadas sempre que o término proximal esteja subgingival.

20. Com relação às restaurações classe II realizadas com resina composta, é CORRETO afirmar que:

- a) matrizes metálicas têm preferência, uma vez que o ponto de contato resultante do seu uso é de boa qualidade.
- b) a potência da luz do fotopolimerizador não é de grande importância, pois é compensada pela flexibilidade da matriz metálica, auxiliando na polimerização da região cervical.
- c) a caixa proximal deve ser preenchida logo após a caixa oclusal.
- d) incrementos de resina feitos de forma horizontal têm resultado inferior aos incrementos feitos de forma inclinada.