

Relatório de Recursos Contra Prova

07/2023/PGP - Concurso Público para cargos técnico-

Protocolo		Nome	
5191		*****	
Campus		CPF	Passaporte
Campus Rio Paranaíba		*****	*****
Cargo / Curso			
Médico / Clínica Médica			
Gabarito	Questão	Prova	
1	3	Médico/clínica Médica	

Justificativa:

Não é mencionado o tipo de diabetes em questão, se diabetes tipo 1 ou tipo 2 que poderia direcionar melhor a resposta. Pois dependendo do tipo de diabetes a recomendação muda segundo as diretrizes da Sociedade brasileira de diabetes edição 2023. Nela se recomenda da seguinte maneira o rastreio:

- É RECOMENDADO iniciar o rastreamento da (retinopatia diabética) RD em todos os adultos com DM1 ao completar cinco anos de duração do diabetes.
- Em pessoas com DM2, É RECOMENDADO iniciar o rastreamento de RD no momento do diagnóstico do diabetes.

Referências:

<https://diretriz.diabetes.org.br/manejo-da-retinopatia-diabetica/>

Situação
Questão mantida

Análise:

O gabarito da questão será mantido pois sua vinheta clínica retrata um quadro clássico, do dia a dia do clínico, de uma paciente adulta/idososa, com sobrepeso, assintomática, com diagnóstico de DM, que analisando a epidemiologia e fisiopatologia reflete o tipo 2 da doença. É recomendado o rastreio no momento do diagnóstico.

Relatório de Recursos Contra Prova

07/2023/PGP - Concurso Público para cargos técnico-

Protocolo		Nome	
5205		*****	
Campus		CPF	Passaporte
Campus Viçosa		*****	*****
Cargo / Curso			
Médico/Pediatria			
Gabarito	Questão	Prova	
1	12	Médico/pediatria	

Justificativa:

TODA monoartrite COM febre tem que ser puncionada para descartar possibilidade de artrite séptica independentemente de outros possíveis diagnósticos diferenciais e até mesmo mais prováveis como purpura de henoch schonlein da questão. Logo como a questão queria a conduta correta naquele momento, deveria primeiro realizar a punção do líquido sinovial do joelho para a análise e posteriormente outras propedêuticas como exame de urina. "A abordagem das artrites agudas exige cuidadosa história clínica e exame físico completo. A punção articular deve sempre ser realizada nos quadros de artrite aguda, para obtenção do líquido sinovial. A análise e a cultura do fluido são exames importantes para o auxílio diagnóstico. " CHACHÁ RCV & LOUZADA Jr P

Referências:

- 1) Diagnóstico da monoartrite aguda na emergência. Rev Bras Clin Med, 2009;7:104-110
- 2) CHACHÁ RCV & LOUZADA Jr P. Acute monoarthritis and acute polyarthritis. Medicina, Ribeirão Preto, 36: 418-426, apr./dec. 2003.

Situação
Questão anulada

Análise:

Questão anulada.

Relatório de Recursos Contra Prova

07/2023/PGP - Concurso Público para cargos técnico-

Protocolo		Nome	
5241		*****	
Campus		CPF	Passaporte
Campus Rio Paranaíba		*****	*****
Cargo / Curso			
Médico / Clínica Médica			
Gabarito	Questão	Prova	
1	29	Médico/clínica Médica	

Justificativa:

Tanto a Apixabana como a Rivaroxabana fazem parte dos novos anticoagulantes orais (NOACs) e possuem efeito rápido, portanto, nessa questão caberia como resposta tanto a alternativa B - Apixabana quanto a alternativa C - Rivaroxabana.

Referências:

FAUCI, A.S.; LONGO, D.L et al. Medicina Interna de Harrison. 20ª. ed. McGraw Hill.

Situação
Questão anulada

Análise:

O recurso está correto e realmente pode-se usar as duas medicações para tratamento agudo do TEP, sem necessidade de realizar a ponte com heparina.