

Conhecimento Específico – Questões de 01 a 30

01. Após consulta médica, o técnico de enfermagem deverá orientar Sr. José de 75 anos com relação ao uso e armazenamento de medicamentos prescritos.

Nesse caso e de acordo com a caderneta de saúde da pessoa idosa de 2018, assinale a orientação CORRETA:

- a) Em todos os atendimentos médicos somente os medicamentos em uso devem ser levados e o médico deve ser informado do uso de chás ou de plantas medicinais.
- b) Nos porta-comprimidos, devem ser deixados somente a quantidade suficiente para 12 horas. Os recipientes devem ser cuidadosamente mantidos limpos e secos.
- c) Para os medicamentos que são acompanhados de medidor, somente este recurso deve ser utilizado, não sendo permitido a sua substituição por colheres caseiras. Após o uso, o medidor deve ser lavado.
- d) Os medicamentos líquidos devem ser guardados em geladeira, conforme orientação de um profissional de saúde. Estes não devem ser guardados na porta da geladeira ou próximo ao congelador. A insulina, por exemplo, perde o efeito se for congelada.

02. Durante o atendimento em uma unidade de saúde, um paciente de 40 anos, que aguardava consulta, apresenta uma parada cardiopulmonar e você, como está mais próximo no momento, dirige-se até ele para prestar os primeiros atendimentos.

Com base nos seus conhecimentos das cadeias de sobrevivência da *American Heart Association* de 2020 e considerando que se encontra em ambiente extra-hospitalar, correlacione as colunas abaixo sobre a sequência a ser realizada na ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

- | | |
|-------------|--|
| 1. Primeiro | () Desfibrilação |
| 2. Segundo | () Recuperação |
| 3. Terceiro | () Ressuscitação avançada |
| 4. Quarto | () Cuidados pós-PCR |
| 5. Quinto | () Acionamento do Serviço de Médico de Emergência |
| 6. Sexto | () RCP de qualidade |

Assinale a sequência CORRETA:

- a) 2, 1, 3, 5, 4, 6.
- b) 1, 2, 4, 3, 5, 6.
- c) 3, 6, 4, 5, 1, 2.
- d) 2, 6, 3, 4, 1, 5.

03. Para que o profissional de enfermagem exerça a profissão com autonomia e com segurança de suas responsabilidades e de seus deveres ele precisa ter ciência destes por meio da Seção I - das Relações com a Pessoa, Família e Coletividade, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

Sendo assim, NÃO é responsabilidade/dever do profissional de enfermagem:

- a) assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- b) respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal, de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.
- c) a depender dos riscos, dos benefícios e das intercorrências acerca da assistência de enfermagem, o profissional pode omitir informações à pessoa, à família e à coletividade.
- d) garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.

04. O Ministério da Saúde compreende o envelhecimento populacional como uma conquista e um triunfo da humanidade no século XX, mas reconhece que existem muitos desafios para que o envelhecimento aconteça com qualidade de vida. No campo das políticas e dos programas dirigidos à população idosa, o desafio é contemplar seus direitos, preferências e necessidades, para a manutenção e melhoria de sua capacidade funcional, garantindo atenção integral à sua saúde. Para tanto, uma das ações do Ministério da Saúde foi elaborar a caderneta de saúde da pessoa idosa.

Tendo como base essa caderneta, analise as afirmativas abaixo, atribuindo V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):

- () A caderneta de saúde da pessoa idosa integra um conjunto de iniciativas que tem por objetivo qualificar a atenção ofertada às pessoas idosas no Sistema Único de Saúde.
- () A caderneta de saúde da pessoa idosa é um instrumento proposto para auxiliar no bom manejo da saúde da pessoa idosa, sendo seu uso exclusivo das equipes de saúde.
- () A caderneta de saúde da pessoa idosa é uma ferramenta de apoio para a avaliação multidimensional a ser realizada no nível primário de atenção.
- () É muito importante que o preenchimento da caderneta de saúde da pessoa idosa seja realizado por meio de informações cedidas pelos profissionais de saúde de forma a orientar a pessoa idosa para o autocuidado.
- () A caderneta permitirá o registro e o acompanhamento, pelo período de cinco anos, de informações sobre dados pessoais, sociais e familiares, sobre suas condições de saúde e seus hábitos de vida, identificando suas vulnerabilidades, além de ofertar orientações para seu autocuidado.

Assinale a sequência CORRETA:

- a) V, F, V, F, V.
- b) F, F, V, F, F.
- c) V, V, F, V, V.
- d) F, V, F, V, F.

05. De acordo com o boletim temático da biblioteca do Ministério da Saúde, embora as quedas em pessoas idosas aconteçam de forma frequente, atitudes simples podem diminuir o risco de cair e podem evitar consequências sérias para a saúde, como fraturas, traumatismo craniano, contusão muscular e medo de cair.

Nesse caso, NÃO é uma orientação do técnico de enfermagem à pessoa idosa, a fim de prevenir quedas no domicílio:

- a) Os objetos que a pessoa idosa precisa devem ser colocados ao seu alcance para evitar subir em banquinhos ou escadas para pegá-los.
- b) A pessoa idosa deve sentar-se em sofás e cadeiras altas e firmes e em poltronas sem braço, pois isso facilita o sentar/levantar.
- c) Se na casa existir escadas, deve ser instalado um corrimão fixado à parede ou ao chão, para que a pessoa idosa consiga se apoiar.
- d) Ao acordar, a pessoa idosa deve levantar-se devagar da cama, para evitar tonturas em razão da queda de pressão.

06. A realização de práticas corporais e atividades físicas proporcionam mais disposição, bem-estar, autonomia e oportunidade de fazer amizades. Além disso, diminui o risco de doenças do coração, osteoporose, diabetes, depressão e certos tipos de câncer. De acordo com essa informação, o Boletim Temático da Biblioteca do Ministério da Saúde de 2022 apresenta recomendações de atividades físicas para idosos.

É uma recomendação desse Boletim:

- a) Realizar atividades físicas de intensidade leve por, pelo menos, 150 minutos por semana.
- b) Realizar atividades físicas de intensidade moderada por, pelo menos, 75 minutos por semana.
- c) Incluir, de 2 a 3 vezes por semana e em dias alternados, a combinação de atividades físicas de intensidade leves e moderadas.
- d) Evitar comportamento sedentário, movimentando-se por 5 minutos a cada hora, bem como reduzir o tempo que permanece sentado ou deitado assistindo televisão ou usando celular.

07. A parada cardiorrespiratória é uma das emergências médicas que necessita de atendimento rápido, eficaz e objetivo. Aliado a isso, a qualidade da reanimação cardiopulmonar é de suma importância na sobrevivência do paciente.

Considere as afirmativas abaixo sobre ações que o técnico de enfermagem precisa executar com precisão em um paciente adulto nesse caso:

- I. Comprimir com força (pelo menos 5 cm) e rápido (100 a 120 min) e aguardar o retorno total do tórax.
- II. Alternar os responsáveis pela compressão a cada 2 minutos, ou antes, se houver cansaço.
- III. Realizar compressão-ventilação com uma relação de 30:2 na ausência de via aérea avançada.
- IV. Evitar ventilação excessiva.
- V. Minimizar interrupções nas compressões.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, II e V, apenas.
- b) II, III e V, apenas.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) I, II, III, IV e V.

08. De acordo com Santos (2010), o processo cicatricial é utilizado para garantir a evolução da ferida e também vai determinar se o tipo de agente utilizado no tratamento está de acordo ou não. Assim, seis fases diferentes compreendem a cicatrização. Sabendo disso, o técnico de enfermagem, ao avaliar a ferida de A. J. M, de 56 anos, identifica sinais de calor, dor, rubor, edema e perda da função e recorda-se que esses sinais referem-se a uma das fases da cicatrização.

Sendo assim, a fase de cicatrização em que se encontra a ferida de A. J. M é a:

- a) Exsudativa.
- b) Proliferativa.
- c) Trombocítica.
- d) Maturação.

09. O processamento de materiais em unidades de saúde é uma atividade de natureza complexa, cujo objetivo é evitar qualquer evento adverso relacionado ao seu uso. Há também preocupação com outros eventos adversos associados a resíduos de material imunológico de um paciente para o outro, por meio desses materiais reprocessados, ou reações decorrentes de resíduos de produtos utilizados durante a limpeza do material. Para tanto, é preciso que os materiais utilizados na assistência à saúde pelas etapas de limpeza, desinfecção e esterilização.

Com relação a essas etapas, analise as afirmativas abaixo.

- I. Limpeza é o processo aplicado a um material ou a uma superfície visando a eliminação de microrganismo e favorecendo a eficácia do processo.
- II. A desinfecção se refere à remoção de sujidade de um material e é fundamental nos processos de desinfecção e esterilização porque reduz a carga microbiana de um material, exceto dos esporos, em condições normais.
- III. Esterilização é o processo que utiliza agentes químicos, físicos ou físico-químicos para destruir as formas de vida microbiana e aplica-se especificamente a objetos inanimados.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I, II e III.

10. As condições de manuseio e estocagem de materiais utilizados na assistência à saúde também precisam ser consideradas no ambiente fora do Centro de Material e Esterilização.

Assim, ao se assumir que o processo, seja qual for, esterilizou o material, as condições de manutenção dessa esterilidade vinculam-se ao risco de recontaminação que é determinado por:

- I. Tipo e configuração do material de embalagem.
- II. Número de pessoas que podem manusear o material antes do uso.
- III. Estocagem em prateleira aberta ou fechada.
- IV. Condições ambientais na área de estocagem (limpeza, temperatura e umidade).
- V. Presença de coberturas plásticas sobre invólucros e métodos de selagem.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II, V apenas.
- b) II, III, IV apenas.
- c) I, IV, V apenas.
- d) I, II, III, IV e V.

11. As doenças surgem e se disseminam de acordo não só com a suscetibilidade do indivíduo, mas também com a região demográfica em que aparecem. Diante disso, é de extrema importância conhecer sobre os tipos de infecção que podem acometer as pessoas que buscam atendimento. Tendo em vista que, na maioria das vezes, essas doenças são bacterianas e virais, correlacione as descrições apresentadas na segunda coluna, de acordo com a primeira coluna:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Infecção por Estafilococo | () A transmissão ocorre por meio de gotículas salivares, provindas do trato respiratório superior. Provoca inflamação das glândulas parotidianas, acompanhada de edema, podendo ser uni ou bilateral. |
| 2. Gripes e resfriados | () A transmissão pode acontecer por contato direto com secreções purulentas. Tem como sinais e sintomas: náuseas, vômitos e diarreia que pode permanecer por até 48 horas, podendo ser controlada em casa ou não. |
| 3. Infecção por Estreptococo | () A transmissão acontece quando há contato direto com outra pessoa ou objeto contaminado. Penetra no corpo pelo trato respiratório ou por algum tipo de ferimento. As infecções mais comuns são otite média, inflamação da garganta, celulite, infecções da pele e em ferimentos, escarlatina. |
| 4. Caxumba | () A transmissão ocorre pelo contato direto, por gotículas salivares, mais existentes em lugares fechados com grande número de pessoas e, principalmente, em locais públicos. Tem como sintomas: calafrios, hipertermia, cefaleia, mialgia, miastenia, inflamação da garganta, tosse e espirros. |

A sequência CORRETA é:

- a) 3, 2, 1, 4.
- b) 4, 1, 3, 2.
- c) 3, 1, 2, 4.
- d) 4, 3, 1, 2.

12. Para realizar atendimento, o profissional de saúde precisa estar ciente da patologia da pessoa que buscou sua assistência para que possa utilizar medidas de precaução. Tais medidas garantem sua segurança como profissional, assim como dos demais indivíduos de um determinado local, quer sejam outros pacientes, quer seja a própria equipe multidisciplinar ao evitar a transmissão e a disseminação de uma infecção.

Sendo assim, o profissional de saúde, ao prestar assistência a uma pessoa com histórico de tosse produtiva, fadiga, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento, deve adotar:

- a) precaução para gotículas, realizando higiene das mãos e máscara cirúrgica.
- b) precaução de contato, realizando higiene das mãos e utilizando avental e luvas.
- c) precaução de aerossóis, realizando higiene das mãos e utilizando máscara PFF2 ou N-95.
- d) precaução padrão, realizando higiene das mãos e utilizando luvas, avental, óculos e máscara cirúrgica.

13. Curativos são procedimentos realizados em algum tipo de lesão, que têm por finalidade limpar a ferida, proteger o tecido do agente agressor, absorver secreções e diminuir o acúmulo de fluidos. Segundo De Morgan, apud Santos (2010), há características consideradas ideais nos curativos para o tratamento de feridas.

Com base no apresentado, analise essas características abaixo, atribuindo V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):

- Promover e manter o meio úmido para cicatrização.
- Permitir trocas gasosas de oxigênio, monóxido de carbono e vapor-d'água.
- Ser permeável.
- Estar isento de partículas contaminantes.
- Permitir a diminuição no tempo de trocas.
- Permitir o monitoramento da ferida.
- Ser aceito pelo paciente.

A sequência CORRETA é:

- a) V, F, F, V, V, V, V.
- b) F, V, V, V, F, F, F.
- c) V, V, V, F, V, F, V.
- d) F, F, F, V, F, V, F.

14. Os pacientes com problemas de saúde empregam uma gama de estratégias para restaurar ou manter a sua saúde. Uma estratégia utilizada com frequência é a medicação e o profissional de enfermagem desempenha uma função essencial no preparo, administração e avaliação dos efeitos das medicações. Com relação a administração de medicamentos, há diferentes vias que podem ser utilizadas, dentre elas tem-se a subcutânea.

Sobre a administração de injeções subcutâneas, assinale a afirmativa CORRETA:

- a) O local mais frequentemente recomendado para as injeções de heparina é a face posterior interna dos braços.
- b) Os locais subcutâneos alternativos incluem as áreas escapulares do dorso e as áreas glúteas dorsal ou ventral superior.
- c) Os melhores locais de injeção subcutânea incluem, a face posterior interna dos braços, o abdômen desde abaixo da margem costal até as cristas ilíacas e as faces posteriores das coxas.
- d) A seringa de insulina de 1 ml com agulha de calibre 32 a 25 pré-encaixadas deve ser utilizada quando for necessário administrar insulina de 100 U e as seringas de tuberculina de 100 U devem ser as utilizadas quando for preciso administrar insulina de 500U.

15. A via intramuscular (IM) propicia absorção de medicamentos mais rápida que a via subcutânea por causa da maior vascularização dos músculos. Contudo, as injeções IM estão associadas a muitos riscos. Assim, ao selecionar um local para administração IM é preciso considerar se a área está isenta de infecções ou necrose; a localização dos ossos, dos nervos e dos principais vasos sanguíneos subjacentes; o volume de medicamento que será administrado; bem como as vantagens e as desvantagens de cada local para este fim.

Com relação a região ventroglúteo, assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) O músculo ventroglúteo envolve o glúteo médio, está situado profundamente e afastado dos principais nervos e vasos sanguíneos.
 - b) Lesões, como fibrose, lesão nervosa, abscesso, necrose tecidual, contração muscular, gangrena e dor, estão associadas ao vetroglúteo.
 - c) O músculo é localizado ao colocar o paciente em uma posição supina ou lateral. Então, é solicitado a flexão do joelho e do quadril para ajudar a relaxar o músculo.
 - d) É considerado o local mais seguro e preferido para administração via IM em adultos, crianças e neonatos, em especial, nos casos de medicamentos que apresentam volumes maiores e são mais viscosos e irritantes.
16. É uma atividade respaldada, que pode ser executada pelo técnico de enfermagem de acordo com a lei do exercício profissional de enfermagem:

- a) Acompanhar a evolução do parto, o trabalho de parto e parto.
- b) Participar da orientação e supervisionar o trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- c) Prescrever e administrar medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública.
- d) Participar em projetos de construção e orientar sobre reforma de unidades de internação.

17. Numa capacitação realizada para técnico de enfermagem sobre manejo clínico da caderneta do adolescente (sexo masculino) do ministério da saúde, foi explicado sobre os estágios do desenvolvimento puberal, isto é, o desenvolvimento dos órgãos genitais e dos pelos pubianos, também chamados de maturação sexual masculina.

Em relação a esses estágios, assinale a afirmativa CORRETA:

- a) Há a presença de pelos mais escuros, mais espessos e encaracolados sobre o púbis – P3 estágio 3.
- b) Há a presença de pelos escuros, espessos e encaracolados, cobrindo totalmente o púbis – P2 estágio 2.
- c) Há o aumento do diâmetro do pênis e desenvolvimento da glândula; aumento de testículos e escroto – G2 estágio 2.
- d) Há o aumento do escroto e dos testículos, sem aumento do pênis; pele da bolsa escrotal fina e rosada – G1 estágio 1.

18. O sintoma mais comumente identificado para a suspeição de gravidez é o atraso menstrual. Outros sintomas e sinais comuns ou específicos podem colaborar para a confirmação da gestação.

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a confirmação da gestação:

- a) O aumento do volume uterino, alterações da forma em que o útero se torna globoso (sinal de Noblé-Budin), diminuição da consistência do istmo (sinal de Hegar) são considerados sinais e sintomas de presunção de gravidez.
- b) A presença de hormônio coriogonadotrófico (hCG) na urina ou no sangue e a presença de batimentos cardíacos fetais no abdome detectados por sonar são considerados sinais e sintomas de certeza de gravidez.
- c) Náuseas e vômitos, sialorreia, alterações do apetite, aversão a certos odores que provocam náuseas e vômitos, lipotimia e tonteados, polaciúria, nictúria e sonolência são considerados sinais e sintomas de probabilidade de gravidez.
- d) Azia, cefaleia, presença de edemas em membros inferiores, sialorreia, vômitos, sinal de Hunter, aréola mamária secundária, melasma facial, linha nigra, e aumento do volume abdominal são considerados sinais e sintomas de presunção de gravidez.

19. A primeira avaliação da gestante deve ser integrada e abranger avaliação clínica, exames complementares, identificação e investigação de fatores de risco. Preferencialmente, deve ser organizada com a lógica da atenção contínua, sendo realizadas avaliações individuais sequenciais pelo médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e outros profissionais da equipe.

Com base no apresentado, NÃO faz parte dessa primeira avaliação:

- a) Exame físico gineco-obstétrico: Exame das mamas – inspeção estática e dinâmica, palpação das glândulas mamárias, segmento axilar e axila, expressão mamária, identificação de proliferação das glândulas, aumento do volume, edema, vasodilatação (rede venosa de Haller).
- b) Exame físico geral: peso, altura, índice de massa corpórea, registro no gráfico de ganho ponderal, pulso, pressão arterial, presença de edema, sistema tegumentar (presença de alterações na pele), mucosa ocular, presença de varizes nos membros inferiores, ausculta cardíaca.
- c) Exame pélvico: inspeção genital (malformações, rupturas, cicatrizes, do períneo e região anal), exame com espéculo vaginal (paredes vaginais, características físicas do conteúdo vaginal, colo uterino, presença de lesões como pólipos), coleta do exame citopatológico e toque vaginal obrigatório.
- d) Exame físico obstétrico: inspeção, palpação, mensuração da altura uterina e ausculta dos batimentos cardíacos fetais (a partir da 12ª semana) e registro do valor exato do número de batimentos cardíacos fetais por minuto, alterações da coloração (linha nigrans), estrias, cicatrizes, tensão (polidrâmnio) e outras alterações.

20. Uma criança de 7 meses e 15 dias, nascida a termo, em aleitamento materno exclusivo, compareceu para uma consulta de puericultura acompanhada de sua mãe. Na sala de espera, a mãe pergunta sobre o esquema de introdução alimentar da criança, para o técnico de enfermagem.

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o esquema alimentar adequado para essa idade:

- a) Leite materno, sucos de frutas, primeira papa principal (almoço ou jantar).
- b) Leite materno, frutas amassadas ou raspadas, segunda papa principal (almoço ou jantar).
- c) Leite materno, frutas amassadas ou raspadas, primeira papa principal (almoço ou jantar).
- d) Leite materno, segunda papa principal (almoço ou jantar), passar para a refeição da família gradativamente.

21. A triagem universal neonatal são ações preventivas que permitem identificar, em tempo oportuno, distúrbios e doenças congênitas e realizar acompanhamento e tratamento para diminuir ou eliminar os danos associados a eles.

Em relação a essas recomendações, assinale o procedimento INCORRETO a ser adotado:

- a) Realização de triagem auditiva neonatal universal em todos os recém-nascidos, antes da alta hospitalar, por ocasião do nascimento pelo teste de otoemissão acústica que deve ser repetido se os resultados da primeira testagem forem alterados.
- b) Realização da triagem oftalmológica neonatal universal em todos os recém-nascidos pelo teste de reflexo vermelho ocular que deve ser realizado antes da alta hospitalar. Nos casos alterados e antes da alta, encaminhar ao oftalmologista para exame oftalmológico de fundo de olho.
- c) Realização do teste do pezinho entre o primeiro e o sétimo dia, mais comumente nas ações do quinto dia, incluindo minimamente a triagem para hipotireoidismo, fenilcetonúria, fibrose cística, deficiência de biotinidase, hiperplasia adrenal congênita, drepanocitose e IgM para toxoplasmose.
- d) Realização de triagem universal para detecção de cardiopatias congênitas pelo teste de oximetria de pulso pré e pós-ductal. Realizar o exame a partir de 24 horas de vida. Quando não houver registro no relatório de alta, será recomendada a realização da oximetria de pulso pela na APS.

22. Uma mulher de 58 anos de idade compareceu à unidade básica de saúde perguntando ao técnico de enfermagem sobre a continuidade da realização do exame de rastreio para câncer de colo uterino.

Sobre a periodicidade de realização do exame citopatológico para essa mulher, o técnico de enfermagem deve:

- a) orientar que os dois primeiros exames devem ser feitos com intervalo anual; se os resultados forem normais, o exame deve ser feito a cada três anos e, se tudo estiver normal, o exame pode ser interrompido aos 64 anos de idade.
- b) orientar que os três primeiros exames devem ser feitos com intervalo de um ano; se os resultados forem normais, o exame deve ser feito a cada três anos e, se tudo estiver normal, o exame pode ser interrompido aos 60 anos de idade.
- c) orientar que os dois primeiros exames devem ser feitos com intervalo anual e, se os resultados forem normais, o exame deve ser feito a cada dois anos e, se tudo estiver normal, o exame pode ser interrompido aos 64 anos de idade.
- d) orientar que os exames devem seguir até os 60 anos de idade com intervalo anual; se a mulher não tiver história prévia de lesões pré-neoplásicas e se houver, pelo menos, dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos, devem ser interrompidos.

23. Um técnico de enfermagem, que trabalha numa unidade de saúde especializada há 8 anos, realizou um medicamento injetável num paciente sem informá-lo sobre o procedimento, contaminou a agulha no momento da aspiração e, mesmo assim, continuou e finalizou o procedimento.

Marque a alternativa que apresenta CORRETAMENTE as duas faltas cometidas pelo profissional, respectivamente:

- a) Negligência e imperícia.
- b) Imperícia e imprudência.
- c) Negligência e imprudência.
- d) Imprudência e negligência.

24. Uma criança de 7 anos de idade foi acometida por parada cardiorrespiratório na rua. Dois adultos que estava passando no local atendem a criança prontamente.

De acordo com as Diretrizes de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) da American Heart Association, 2020, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE as ações que deverão ser executadas por esses socorristas para melhor qualidade de reanimação cardiopulmonar:

- a) Se a criança tiver sem via aérea avançada, a relação compressão ventilação deve ser de 15:1, alternando os responsáveis pelas compressões a cada 2 minutos.
 - b) Se a criança tiver sem via aérea avançada, a relação compressão ventilação deve ser de 15:2, alternando os responsáveis pelas compressões a cada 2 minutos.
 - c) Se a criança tiver sem via aérea avançada, a relação compressão ventilação deve ser de 30:1, sem alternar o responsável pela compressão minimizando a eficácia.
 - d) Se a criança tiver sem via aérea avançada, a relação compressão ventilação deve ser de 30:2, sem alternar o responsável pela compressão minimizando a eficácia.
25. O controle da respiração durante a aferição de sinais vitais pode trazer informações significativas sobre o estado de saúde do paciente.

Dessa forma, a frequência de respiração que é regular, mas anormalmente rápida, maior que 20 respirações por minuto, é denominada:

- a) hiperpneia.
 - b) taquipneia.
 - c) taquisfigmia.
 - d) taquicardia.
26. No registro de enfermagem, são utilizados alguns termos técnicos para descrição de assuntos relacionados à saúde do paciente.

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o termo referente à “dor ao urinar”:

- a) disúria.
 - b) enurese.
 - c) polaciúria.
 - d) pielonefrite.
27. Para se administrar medicamentos oftálmicos (gotas oftálmicas), existem alguns cuidados na execução da técnica.

NÃO é um desses cuidados:

- a) Repetir a instilação do medicamento ou solução oftálmica caso o paciente pisque ou caia fora da margem conjutival.
- b) Segurar o conta-gotas cheio de medicamento ou solução oftálmica, aproximadamente de 1 a 2 cm acima do saco conjutival.
- c) Aplicar pressão vigorosa com lenço limpo sobre o ducto lacrimal em caso de medicamento ou solução oftálmica sistêmica.
- d) Esperar 5 minutos antes de aplicar o medicamento ou solução oftálmica, caso ele tenha mais de um medicamento a ser aplicado simultaneamente no mesmo olho.

28. De acordo com a nota técnica de saúde da criança, do ministério da saúde, é necessário realizar a classificação de risco do recém-nascido para o devido encaminhamento dentro das redes de atenção em saúde.

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a classificação do recém-nascido quanto à idade gestacional:

- a) recém-nascido a termo precoce – idade gestacional de 37 e 38 semanas.
- b) recém-nascido a termo completo – idade gestacional de 37 a 41 semanas.
- c) recém-nascido pré-termo tardio – idade gestacional de 34 a 35 semanas.
- d) recém-nascido pré-termo moderado – idade gestacional de 28 a 32 semanas.

29. O câncer de mama é uma doença muito prevalente no Brasil. Por isso, em uma sala de espera numa unidade básica de saúde, algumas informações podem ser fornecidas às mulheres sobre câncer de mama.

Em relação a essas informações, assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) A nuliparidade e ter tido filho após os 31 anos são considerados fatores de risco para câncer de mama.
- b) O uso de medicamentos digitálicos ou esteroides e de cafeína podem causar alterações fibrocísticas da mama.
- c) A menarca precoce (antes dos 12 anos) ou a menopausa tardia não são considerados fatores de risco para o câncer de mama.
- d) O excesso de peso, a alta ingestão de álcool e baixo nível de atividade física aumenta as chances de câncer de mama.

30. A respeito de termos técnicos utilizados na prática de enfermagem, correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Icterícia | () Colaração amarelada da conjuntiva. |
| 2. Hipertermia | () Pálpebras viradas pra fora. |
| 3. Nistagmo | () Temperatura corporal elevada. |
| 4. Ectrópio | () Oscilação rítmica e involuntária dos olhos. |

A sequência CORRETA é:

- a) 1, 4, 2, 3.
- b) 3, 1, 2, 4.
- c) 2, 1, 4, 3.
- d) 4, 1, 3, 2.