

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7042		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	8	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

1- Argumento: A afirmação "As leguminosas para adubação verde reduzem as populações de nematoides" é um princípio fundamental da Olericultura e do manejo de grandes culturas.  
 2-Argumento: A alternativa afirma que "As espécies do gênero Crotalaria são suscetíveis ao complexo de fungos do solo". Esta frase é tecnicamente falsa por dois motivos:

**Referências:**

LIMA FILHO OF, AMBROSANO EJ, ROSSI F, CARLOS JAD, organizadores. Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: fundamentos e prática. Brasília, DF: Embrapa; 2014. v.1. 507p.  
 VENZON, M.; PAILA Jr, T.J.de. 101 Culturas – Manual de tecnologias agrícolas, 2ª edição, revista e atualizada. Viçosa: EPAMIG. 2019. 920 p.

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

1- Argumento: A afirmação "As leguminosas para adubação verde reduzem as populações de nematoides" é um princípio fundamental da Olericultura e do manejo de grandes culturas. RESPOSTA: A afirmação da alternativa tem uma generalização que não condiz com o conhecimento técnico-científico. Muitas espécies de adubação verde são altamente suscetíveis a nematoides (pg 469-470, Inomoto & Asmus, Adubos verdes das famílias Fabaceae e Momosaceae para o controle de fitonematoides. Cap 12 in: LIMA FILHO OF, AMBROSANO EJ, ROSSI F, CARLOS JAD, organizadores. Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: fundamentos e prática. Brasília, DF: Embrapa; 2014. v.1. 507p.) Portanto esta alternativa é incorreta. 2-Argumento: A alternativa afirma que "As espécies do gênero Crotalaria são suscetíveis ao complexo de fungos do solo". Esta frase é tecnicamente falsa por dois motivos: RESPOSTA: Não são apresentados os 'dois motivos'. Além disso, as crotalárias são suscetíveis ao complexo de fungos do solo (pg 404 e 405, Carvalho et al., Pragas e doenças em adubos verdes, Cap. 11 IN: LIMA FILHO OF, AMBROSANO EJ, ROSSI F, CARLOS JAD, organizadores. Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: fundamentos e prática. Brasília, DF: Embrapa; 2014. v.1. 507p. Diante disso, o gabarito oficial reflete o conhecimento técnico consolidado e está em sintonia com referência científica mais atualizada. Portanto, o gabarito oficial permanece.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7043		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	19	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

Do Conceito de Restos Culturais como Vetores (Sediyama et al., 2015):

Conforme SEDIYAMA et al. (2015), na obra "Soja do Plantio à Colheita", o nematoide-de-cisto (*Heterodera glycines*) possui uma fase de vida sésseis, onde a fêmea permanece aderida ao sistema radicular. Após a colheita, essas raízes infectadas tornam-se "restos culturais" que abrigam os cistos. A permanência desses restos na área, ou sua dispersão por implementos, facilita a sobrevivência e a disseminação do patógeno. Portanto, a eliminação ou manejo desses restos (via destruição química ou mecânica) é uma medida de controle cultural indireta para reduzir a reinfestação.

Do Manejo Sanitário e Plantas Voluntárias (Borém et al., 2017): Na bibliografia de BORÉM (2017), ressalta-se que o manejo de doenças de solo exige a eliminação de plantas voluntárias (tigueras). Tecnicamente, a soja voluntária que permanece na área após a colheita é classificada como resto cultural vivo. Se esses restos não forem eliminados, o nematoide continua a se reproduzir na entressafra, aumentando a População Inicial (\$Pi\$) para o próximo plantio. Assim, a assertiva III é uma estratégia legítima de manejo de controle. Da Redução do Inóculo Primário:

A literatura da UFV (Filgueira, 2007; Fontes, 2021) ensina que qualquer prática que vise a redução do inóculo presente na área é considerada manejo de controle. Ao eliminar restos culturais infectados (especialmente as raízes que contêm as fêmeas), o produtor retira do sistema uma quantidade significativa de ovos que seriam liberados no solo após a decomposição natural, auxiliando no controle populacional a longo prazo.

**Referências:**

SEDIYAMA, TUNEO; SILVA, FELIPE; BORÉM, ALUIZIO (Ed.). Soja do plantio à colheita. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2015. 333 p.

FILGUEIRA, F.A.R. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças. 3ª ed. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2007. 421p

FONTES, P.C.R.; NICK, C. Olericultura Teoria e Prática (2ª Edição). Viçosa: Editora UFV. 2021. 632 p.  
MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S.; PALARETTI, L. F. Irrigação: princípios e métodos. Viçosa: UFV, 2007

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7044		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	27	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

A Comissão Organizadora,

Solicita-se a alteração do gabarito da questão 27 da alternativa (c) para a alternativa (b), com base nos fundamentos científicos .

**Referências:**

BOREM, A.; GALVAO, J.C.C.; PIMENTEL, M.A.G. (Ed.). Milho: do plantio à colheita. 2. ed. atual. e ampl. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2017. 382 p.

<b>Situação</b>
Mudança de gabarito

**Análise:**

A questão 27 deverá ter o Gabarito Oficial alterado, onde se lê "C", leia-se "B". Segue a questão: "As cultivares de milho são classificadas em: (1) Híbridos simples; (2) Híbridos triplos; (3) Híbridos duplos; e (4) Variedades. Assinale a alternativa que classifica essas cultivares quanto à maior homogeneidade das plantas e maior produtividade, em ordem crescente:" A resposta correta é letra B (4, 3, 2 e 1) e não letra C (1, 2, 3 e 4) conforme divulgado no Gabarito Oficial. Assim a banca examinadora solicitou a alteração do Gabarito Oficial publicado.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7032		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	8	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

O gabarito oficial indica a alternativa A como incorreta. Entretanto, essa alternativa está em conformidade com a literatura científica atualizada sobre adubação verde.

A prática da adubação verde é amplamente reconhecida como um dos métodos mais valiosos e econômicos para o controle de nematoides, desde que se utilizem espécies adequadas, como crotalárias e mucunas. Portanto, afirmar que "As leguminosas para adubação verde reduzem as populações de nematoides" é correto e respaldado por evidências científicas.

Já a alternativa D é a que apresenta informação incorreta, pois as espécies do gênero *Crotalaria* não são suscetíveis ao complexo de fungos do solo. Pelo contrário, são recomendadas para o manejo de nematoides e para a melhoria da sanidade do solo.

Diante disso, o gabarito oficial não reflete o conhecimento técnico consolidado e contradiz a referência científica mais atualizada. Solicita-se, portanto, a anulação da questão ou a retificação do gabarito, considerando que a alternativa realmente incorreta é a D.

**Referências:**

Referência  
LIMA FILHO, O. F.; AMBROSANO, E. J.; WUTKE, E. B.; ROSSI, F.; CARLOS, J. A. D. (eds.). Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: Fundamentos e Prática. 2ª ed. rev. e atualizada. Brasília, DF: Embrapa, 2023.

**Situação**

Questão mantida

**Análise:**

A prática da adubação verde é amplamente reconhecida como um dos métodos mais valiosos e econômicos para o controle de nematoides, desde que se utilizem espécies adequadas, como crotalárias e mucunas. Portanto, afirmar que "As leguminosas para adubação verde reduzem as populações de nematoides" é correto e respaldado por evidências científicas. RESPOSTA: A afirmação da alternativa tem uma generalização que não condiz com o conhecimento técnico-científico. Muitas espécies de adubação verde são altamente suscetíveis a nematoides (pg 469-470, Inomoto & Asmus, Adubos verdes das famílias Fabaceae e Mimosaceae para o controle de fitonematoides. Cap 12 in: LIMA FILHO OF, AMBROSANO EJ, ROSSI F, CARLOS JAD, organizadores. Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: fundamentos e prática. Brasília, DF: Embrapa; 2014. v.1. 507p.) Portanto esta alternativa é incorreta. Já a alternativa D é a que apresenta informação incorreta, pois as espécies do gênero *Crotalaria* não são suscetíveis ao complexo de fungos do solo. Pelo contrário, são recomendadas para o manejo de nematoides e para a melhoria da sanidade do solo. RESPOSTA: O reclamante confunde 'fungos' com 'nematoides em sua argumentação. as crotalárias são suscetíveis ao complexo de fungos do solo (pg 404 e 405, Carvalho et al., Pragas e doenças em adubos verdes, Cap. 11 IN: LIMA FILHO OF, AMBROSANO EJ, ROSSI F, CARLOS JAD, organizadores. Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: fundamentos e prática. Brasília, DF: Embrapa; 2014. v.1. 507p. Diante disso, o gabarito oficial reflete o conhecimento técnico consolidado e está em sintonia com referência científica mais atualizada. Portanto, o gabarito oficial permanece.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7035		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	24	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

Alternativa (b): "Ampliação do espaçamento entre fileiras para 0,70 m"

A literatura agrônômica recomenda maior espaçamento e menor densidade de plantas para favorecer a aeração e reduzir a umidade no dossel.

Contudo, não há indicação técnica consolidada de que o valor fixo de 0,70 m seja medida oficial ou universalmente recomendada.

A menção a um número específico sem respaldo científico torna a alternativa incorreta ou, no mínimo, imprecisa.

Dessa forma, a questão apresenta duas alternativas com informações equivocadas ou não respaldadas por fontes técnicas consolidadas, o que gera ambiguidade e inviabiliza a escolha de uma resposta correta.

Solicita-se, portanto, a anulação da questão por erro técnico, garantindo a lisura e a objetividade do processo avaliativo.

**Referências:**

VIEIRA, C.; PAULA JUNIOR, Trazilbo José de; BORÉM, Aluizio (Ed.). Feijão. 2. ed. atualizada. Viçosa, MG: Editora UFV, 2006.

CARNEIRO, J.E.S.; PAULA JÚNIOR, T.J.; BORÉM, A. Feijão do plantio à colheita. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2015 384 p.

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7028		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	8	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

A questão apresenta inconsistências técnicas nas alternativas a) e b), comprometendo sua validade. Alternativa A: A pulverização da parte aérea com fungicidas não é considerada medida eficaz para o controle do mofo-branco (*Sclerotinia sclerotiorum*). O patógeno desenvolve principalmente a partir de escleródios presentes no solo e na base das plantas, locais onde a pulverização foliar não apresenta eficiência significativa. As recomendações técnicas (Vieira; Paula Júnior; Borém, Feijão, 2ª ed., páginas 375 - 377; Carneiro et al., 2015) argumentam que as medidas culturais e manejo da irrigação, não a pulverização da parte aérea como prática recomendada. Alternativa B (gabarito): A ampliação do espaçamento entre fileiras para 0,70 m não encontra respaldo técnico. Vieira et al. (2006) e Carneiro et al. (2015) recomenda maior espaçamento e menor densidade de plantas para favorecer a aeração e reduzir a umidade, mas não estabelece o valor fixo de 0,70 m como medida oficial. A indicação de número específico sem base científica torna a alternativa incorreta ou, no mínimo, imprecisa. Com base, a informação da literatura, sugerida. Dessa forma, a questão apresenta duas alternativas com informações equivocadas ou não respaldadas por fontes técnicas consolidadas, o que gera ambiguidade e inviabiliza a escolha de uma resposta correta. Por esse motivo, solicita-se a anulação da questão por erro técnico.

**Referências:**

CARNEIRO, J.E.S.; PAULA JUNIOR, T.J.; BOREM, A. Feijão do plantio à colheita. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2015 384 p.  
 VIEIRA, C.; PAULA JÚNIOR, Trazilbo José de; BORÉM, Aluizio (Ed.). Feijão. 2. ed. atualizada. Viçosa, MG: Editora UFV, 2006.

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

A questão apresenta inconsistências técnicas nas alternativas a) e b), comprometendo sua validade. Alternativa A: A pulverização da parte aérea com fungicidas não é considerada medida eficaz para o controle do mofo-branco (*Sclerotinia sclerotiorum*). O patógeno desenvolve principalmente a partir de escleródios presentes no solo e na base das plantas, locais onde a pulverização foliar não apresenta eficiência significativa. As recomendações técnicas (Vieira; Paula Júnior; Borém, Feijão, 2ª ed., páginas 375 - 377; Carneiro et al., 2015) argumentam que as medidas culturais e manejo da irrigação, não a pulverização da parte aérea como prática recomendada. Alternativa B (gabarito): A ampliação do espaçamento entre fileiras para 0,70 m não encontra respaldo técnico. Vieira et al. (2006) e Carneiro et al. (2015) recomenda maior espaçamento e menor densidade de plantas para favorecer a aeração e reduzir a umidade, mas não estabelece o valor fixo de 0,70 m como medida oficial. A indicação de número específico sem base científica torna a alternativa incorreta ou, no mínimo, imprecisa. Com base, a informação da literatura, sugerida. Dessa forma, a questão apresenta duas alternativas com informações equivocadas ou não respaldadas por fontes técnicas consolidadas, o que gera ambiguidade e inviabiliza a escolha de uma resposta correta. Por esse motivo, solicita-se a anulação da questão por erro técnico. RESPOSTA: A argumentação não se refere à questão 8 e a solicitação está, portanto, indeferida.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7030		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	24	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

O gabarito oficial indica a alternativa A como incorreta. Entretanto, essa alternativa está em conformidade com a literatura científica atualizada sobre adubação verde. A prática da adubação verde é amplamente reconhecida como métodos valiosos e econômicos para o controle de nematoides, desde que se utilizem espécies adequadas, como crotalárias e mucunas. Portanto, afirmar que "As leguminosas para adubação verde reduzem as populações de nematoides" é correto e respaldado por evidências científicas. Já a alternativa D é a que apresenta informação incorreta, pois as espécies do gênero *Crotalaria* não são suscetíveis ao complexo de fungos do solo. Pelo contrário, são recomendadas para o manejo de nematoides e para a melhoria da sanidade do solo (LIMA FILHO et al. 2023; Página 54). Diante disso, o gabarito oficial não reflete o conhecimento técnico consolidado e contradiz a referência científica atualizada. Solicita-se, portanto, a anulação da questão, considerando que a alternativa realmente incorreta é a D.

**Referências:**

LIMA FILHO, O. F.; AMBROSANO, E. J.; WUTKE, E. B.; ROSSI, F.; CARLOS, J. A. D. (eds.). Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: Fundamentos e Prática. 2ª ed. rev. e atualizada. Brasília, DF: Embrapa, 2023.

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

A argumentação não se refere à questão 24 e a solicitação está, portanto, indeferida.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7031		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	8	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

O gabarito oficial indica a alternativa A como incorreta. Entretanto, essa alternativa está em conformidade com a literatura científica atualizada sobre adubação verde. A prática da adubação verde é amplamente reconhecida como métodos valiosos e econômicos para o controle de nematoides, desde que se utilizem espécies adequadas, como crotalárias e mucunas. Portanto, afirmar que "As leguminosas para adubação verde reduzem as populações de nematoides" é correto e respaldado por evidências científicas. Já a alternativa D é a que apresenta informação incorreta, pois as espécies do gênero Crotalaria não são suscetíveis ao complexo de fungos do solo. Pelo contrário, são recomendadas para o manejo de nematoides e para a melhoria da sanidade do solo (LIMA FILHO et al. 2023; Página 54). Diante disso, o gabarito oficial não reflete o conhecimento técnico consolidado e contradiz a referência científica atualizada. Solicita-se, portanto, a anulação da questão, considerando que a alternativa realmente incorreta é a D.

**Referências:**

LIMA FILHO, O. F.; AMBROSANO, E. J.; WUTKE, E. B.; ROSSI, F.; CARLOS, J. A. D. (eds.). Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: Fundamentos e Prática. 2ª ed. rev. e atualizada. Brasília, DF: Embrapa, 2023.

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7033		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	24	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

A questão apresenta inconsistências técnicas nas alternativas a) e b), comprometendo sua validade.

Alternativa A: A pulverização da parte aérea com fungicidas não é considerada medida eficaz para o controle do mofo-branco (*Sclerotinia sclerotiorum*). O patógeno se desenvolve principalmente a partir de escleródios presentes no solo e na base das plantas, locais onde a pulverização foliar não apresenta eficiência significativa. As recomendações técnicas oficiais (Vieira; Paula Júnior; Borém, Feijão, 2ª ed., página 375-377; Vieira et al., 2011) enfatizam medidas culturais e manejo da irrigação, não a pulverização da parte aérea como prática recomendada. Alternativa B (gabarito): A ampliação do espaçamento entre fileiras para 0,70 m não encontra respaldo técnico. Vieira et al. (2006 e 2011) e Carneiro et al. (2015) argumenta que recomendação de maior espaçamento e menor densidade de plantas para favorecer a aeração e reduzir a umidade, mas não estabelece o valor fixo de 0,70 m como medida oficial, uma vez que está estimativa deverá ser reportado por fundamentos científicos. A indicação de número específico sem base científica torna a alternativa incorreta ou, no mínimo, imprecisa. Com base, a informação da literatura, sugerida. Dessa forma, a questão apresenta duas alternativas com informações equivocadas ou não respaldadas por fontes técnicas consolidadas, o que gera ambiguidade e inviabiliza a escolha de uma resposta correta. Por esse motivo, solicita-se a anulação da questão por erro técnico.

**Referências:**

VIEIRA, C.; PAULA JÚNIOR, Trazilbo José de; BORÉM, Aluizio (Ed.). Feijão. 2. ed. atualizada. Viçosa, MG: Editora UFV, 2006.  
 CARNEIRO, J.E.S.; PAULA JÚNIOR, T.J.; BORÉM, A. Feijão do plantio à colheita. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2015 384 p.

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7041		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	3	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

A Banca Examinadora,

Venho interpor recurso contra o gabarito da questão 03, solicitando sua anulação por ambiguidade e por haver duas possíveis alternativas corretas "B" e "C".

A questão trata da profundidade de amostragem do solo para implantação de frutíferas arbóreas, porém desconsidera que não há uma única profundidade padrão universalmente aplicável, sendo esta dependente de fatores como espécie cultivada, sistema de manejo e condições edafoclimáticas.

Entretanto, conforme publicações mais recentes da Embrapa, para culturas arbóreas e sistemas perenes, pode ser necessária a amostragem em maiores profundidades (como 40–60 cm), especialmente quando se busca avaliar limitações químicas ou físicas em camadas mais profundas do solo, onde ocorre o desenvolvimento radicular:

EMBRAPA. Manual de métodos de análise de solo. 3. ed. Brasília: Embrapa, 2017.

EMBRAPA. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 5. ed. Brasília: Embrapa, 2018.

Além disso, segundo Cantarutti et al. (2007), a profundidade de amostragem deve ser ajustada conforme o sistema de cultivo, sendo comum a adoção de diferentes camadas para melhor caracterização do perfil do solo em culturas perenes:

CANTARUTTI, R.B. et al. Avaliação da fertilidade do solo e recomendação de corretivos e fertilizantes. In: NOVAIS, R.F. et al. (eds.). Fertilidade do solo. Viçosa: SBCS, 2007.

Dessa forma, tanto a alternativa "b" (0–20 cm e 20–40 cm) quanto a alternativa "c" (0–30 cm e 30–60 cm) podem ser consideradas tecnicamente plausíveis, dependendo do contexto agrônomico adotado.

Solicita-se, portanto, a anulação da questão.

**Referências:**

EMBRAPA. Manual de métodos de análise de solo. 3. ed. Brasília: Embrapa, 2017.

EMBRAPA. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 5. ed. Brasília: Embrapa, 2018.

CANTARUTTI, R.B. et al. Avaliação da fertilidade do solo e recomendação de corretivos e fertilizantes. In: NOVAIS, R.F. et al. (eds.). Fertilidade do solo. Viçosa: SBCS, 2007.

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7052		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	7	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

A Banca Examinadora,

Venho interpor recurso contra o gabarito da questão 07, que considerou como incorreta a alternativa "B".

A alternativa afirma que os adubos verdes "têm pouca influência sobre o banco de sementes de plantas daninhas no solo".

Entretanto, de acordo com Teasdale (1996), o uso de plantas de cobertura exerce papel importante no manejo de plantas daninhas, atuando não apenas na supressão da emergência, mas também influenciando a dinâmica do banco de sementes ao longo do tempo.

Buhler et al. (1997) destacam que práticas como rotação de culturas e uso de cobertura vegetal alteram significativamente a dinâmica do banco de sementes de plantas daninhas, podendo reduzir sua densidade e viabilidade ao longo dos ciclos agrícolas.

Oliveira et al. (2014), em publicação da Embrapa, apontam que a adubação verde pode interferir na comunidade infestante por meio de competição, alelopatia e modificação das condições edáficas, refletindo também na composição e no comportamento do banco de sementes.

Dessa forma, a afirmação de que os adubos verdes exercem "pouca influência" sobre o banco de sementes não pode ser considerada uma regra geral, sendo dependente de fatores como espécie utilizada, tempo de adoção do sistema e condições de manejo.

Diante do exposto, solicita-se a anulação da questão.

**Referências:**

TEASDALE, J.R. Contribution of cover crops to weed management in sustainable agricultural systems. Journal of Production Agriculture, 1996.

BUHLER, D.D.; HARTZLER, R.G.; FORCELLA, F. Implications of weed seedbank dynamics to weed management. Weed Science, 1997.

OLIVEIRA, M.F. et al. Manejo de plantas daninhas. Embrapa, 2014.

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

A alternativa afirma que os adubos verdes "têm pouca influência sobre o banco de sementes de plantas daninhas no solo". Entretanto, de acordo com Teasdale (1996), o uso de plantas de cobertura exerce papel importante no manejo de plantas daninhas, atuando não apenas na supressão da emergência, mas também influenciando a dinâmica do banco de sementes ao longo do tempo. Buhler et al. (1997) destacam que práticas como rotação de culturas e uso de cobertura vegetal alteram significativamente a dinâmica do banco de sementes de plantas daninhas, podendo reduzir sua densidade e viabilidade ao longo dos ciclos agrícolas. Oliveira et al. (2014), em publicação da Embrapa, apontam que a adubação verde pode interferir na comunidade infestante por meio de competição, alelopatia e modificação das condições edáficas, refletindo também na composição e no comportamento do banco de sementes. Dessa forma, a afirmação de que os adubos verdes exercem "pouca influência" sobre o banco de sementes não pode ser considerada uma regra geral, sendo dependente de fatores como espécie utilizada, tempo de adoção do sistema e condições de manejo. RESPOSTA: A literatura para o concurso foi fornecida no Edital. Os adubos verdes alteram a composição e comportamento do banco de sementes do solo, como o próprio reclamante reconhece em sua argumentação. Portanto, os adubos verdes exercem influência sobre o banco de sementes do solo e a alternativa b) está incorreta e o gabarito permanece.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7053		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	12	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

A Banca Examinadora,

Venho interpor recurso contra o gabarito da questão 12, que considerou como correta a alternativa "C".

A alternativa afirma que a obtenção de tubérculos com alta gravidade específica exige que o ciclo de cultivo da batateira seja "o mais longo possível".

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, "A colheita deve ser realizada quando os tubérculos atingirem maturidade fisiológica, caracterizada pela firmeza da película e secagem da parte aérea." (EMBRAPA, 2023).

Assim, o prolongamento excessivo do ciclo não é recomendado, podendo inclusive comprometer a qualidade dos tubérculos, com aumento de perdas por brotação, doenças e deterioração.

Dessa forma, embora exista relação entre o tempo de desenvolvimento da cultura e o acúmulo de matéria seca, não é correto afirmar que o ciclo deve ser "o mais longo possível", uma vez que o manejo adequado considera um ponto ótimo de colheita.

Diante do exposto, solicita-se a anulação da questão.

**Referências:**

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Cultivo da batata: colheita e pós-colheita. Brasília: Embrapa Hortaliças, 2023.

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7021		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	3	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

Interponho recurso contra a questão 03, solicitando anulação. Literaturas, como a 5ª Aproximação da Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, recomendam a amostragem do solo nas camadas de 0–20 cm e 20–40 cm, amplamente utilizadas para culturas perenes, como frutíferas arbóreas. Entretanto, também há referências, como literaturas da Embrapa, que recomendam a amostragem em camadas de 40–60 cm, em determinados contextos e frequências, para uma avaliação mais completa do perfil do solo onde o desenvolvimento radicular é mais profundo, como exemplo identificar possíveis limitações físicas ou químicas. Ressalta-se que a profundidade de amostragem não é fixa, podendo variar conforme a espécie cultivada, o sistema de manejo e da necessidade de avaliação da qualidade do solo, como exemplo para o sistema plantio direto que amostragem pode ser de 0-10 cm a depender do contexto. Adicionalmente, a alternativa “d” apresenta redundância, ao sugerir a análise de camadas sobrepostas; e a alternativa “a” incongruente para implantação de frutíferas arbóreas.

**Referências:**

ALVAREZ, V.V.H.; NOVAIS, R.F.D.; BARROS, N.F.D.; CANTARUTTI, R.B.; LOPES, A.S. Recomendação para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais: 5. Aproximação. Viçosa: Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, 1999. 322p.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Amostragem de solo para fins de fertilidade. Brasília, DF: Embrapa, 2002. (Circular Técnica, 61).

EMBRAPA. Amostragem de Solo para Recomendação de Calagem e Adubação. Brasília, DF: Embrapa Solos, 2020. Disponível em: Infoteca-e.

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7018		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	8	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

Na questão 08, a alternativa "a" foi dada como INCORRETA. Nesta alternativa, lê-se "As leguminosas para adubação verde reduzem as populações de nematoides". Todavia, as leguminosas usadas na adubação verde reduzem populações de nematoides pela liberação de substâncias fitonematicidas ou por atuarem como plantas armadilhas em que o nematoide parasita e não completa seu ciclo. Há diversos trabalhos mencionando como o uso de leguminosas diminuem a ação dos nematoides. Tejo et al. (2020), Berry et al. (2009) e Moraes et al. (2006). Segundo Tejo et al. (2020), o uso de leguminosas como plantas antagonistas reduz a população de fitonematoides. Berry et al. (2009) afirma que as leguminosas auxiliam na diminuição da população de nematoides fitopatogênicos, como os dos gêneros *Meloidogyne* e *Pratylenchus*, ao mesmo tempo que aumentam a população de nematoides de vida livre, os quais são importantes para a biodiversidade do solo. Moraes et al. (2006) menciona que a incorporação de leguminosas reduz a população de nematoides em cultivos de hortaliças.

Diante dos argumentos expostos, pode-se concluir que a alternativa "a" está correta.

No entanto, na alternativa "d", lê-se "As espécies do gênero *Crotalaria* são suscetíveis ao complexo de fungos do solo." Entretanto, ocorre o contrário. De acordo com a sugestão de literatura fornecida no edital - Lima Filho et al. (2014), a informação correta é que as espécies do gênero *Crotalaria* são resistentes ao complexo de fungos do solo, e não suscetíveis. Este argumento de Lima Filho et al. (2014) pode ser reforçado pelos seguintes tópicos:

- O uso do sujeito "As espécies do gênero *Crotalaria*" é generalista dando a entender que toda e qualquer espécie do gênero citado é suscetível ao complexo de fungos do solo. Enquanto, a única exceção é a *Crotalaria juncea* que apresenta suscetibilidade específica ao fungo *Ceratocystis fimbriata*.

- Se a afirmação "As espécies do gênero *Crotalaria* são suscetíveis ao complexo de fungos do solo." é verdade, o fundamento da adubação verde - Melhoria da Sanidade Vegetal e do Equilíbrio Biológico do Solo – abordado por Lima Filho et al. (2014) não é válido. Sendo assim, as *crotalárias* não poderiam ser adotadas como adubos verdes.

- O tópico anterior ainda é reforçado por uma literatura recente elaborada por Lima Filho et al. (2023) - Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: fundamentos e prática - Volume 1. No capítulo 1 (Calegari, 2023) lemos na íntegra: "O princípio de controle de pragas e doenças adotado pelo sistema de rotação de culturas (incluindo o uso de plantas de cobertura) baseia-se em eliminar ou suprimir o substrato para o inseto ou patógeno." Ainda neste capítulo possível ler outros trechos que corroboram a linha de raciocínio abordada.

Diante dos pontos abordados, podemos concluir que a alternativa "d" dada como correta, na verdade, está INCORRETA. Sendo assim, eu entro com recurso para que a resposta da questão 8 seja trocada da alternativa "a" para a alternativa "d".

**Referências:**

BERRY, S. D.; DANA, P.; SPAULL, V. W.; CADET, P. Effect of intercropping on nematodes in two small-scale sugarcane farming systems in South Africa. *Nematropica*, p. 11-34, 2009.

CALEGARI, A. Benefícios do uso de adubos verdes como garantia de sustentabilidade e aumento da biodiversidade dos sistemas agrícolas. In: LIMA FILHO, O. F. de; AMBROSANO, E. J.; WUTKE, E. B.; ROSSI, F.; CARLOS, J. A. D. Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: fundamentos e prática - Volume 1. Brasília, DF: Embrapa; 2023. v.1. 564p

LIMA FILHO, O. F. de; AMBROSANO, E. J.; WUTKE, E. B.; ROSSI, F.; CARLOS, J. A. D. Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: fundamentos e prática. Brasília, DF: Embrapa; 2014. v.1. 507p.

LIMA FILHO, O. F. de; AMBROSANO, E. J.; WUTKE, E. B.; ROSSI, F.; CARLOS, J. A. D. Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: fundamentos e prática - Volume 1. Brasília, DF: Embrapa; 2023. v.1. 564p.

MORAES, S. R.; CAMPOS, V. P.; POZZA, E. A.; FONTANETTI, A.; CARVALHO, G. J.; MAXIMINIANO, C. Influência de leguminosas no controle de fitonematoides no cultivo orgânico de alface americana e de repolho. *Fitopatologia Brasileira*, v. 31, n. 2, p. 188-191, 2006.

TEJO, D. P.; DOS SANTOS, C. H. F.; BURATTO, J. S. Fitonematoides e estratégias adotadas em seu controle. *Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde*, v. 24, n. 2, p. 126-130, 2020.

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7025		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	26	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

Na questão 26, lê-se “A sucessão soja/milho é um sucesso no Brasil, entretanto, o uso de cultivares transgênicos de Soja RR e de milho RR podem”. Essa questão foi mal formulada. A assertiva supracitada usa uma locução verbal iniciada pelo auxiliar no presente do indicativo “podem” que deveria ser seguida de um verbo principal no infinitivo (por exemplo, facilitar, diminuir ou dificultar) (Bechara, 2010 e 2019). Nas alternativas “a”, “b” e “c”, há verbos no infinito. Diante disso, caberia ao candidato usar técnicas de raciocínio lógico e noções de gramática ao interpretar, portanto, dentro das opções a mais cabível era “diminuir a resistência das plantas ao herbicida”. Se a alternativa “d” era a correta, então deveria ter sido formulada da seguinte forma – podem necessitar do uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação, em razão das tiguietas de milho e soja. Mais uma vez, é preciso ressaltar que as bancas de concurso induzem os candidatos ao erro como forma de selecionar os mais bem preparados. A preparação não envolve apenas conhecimento técnico, é preciso dominar outros conhecimentos como interpretação de texto, uso da gramática e raciocínio lógico. Portanto, quem utilizou destas ferramentas foi prejudicado por um erro gramatical oriundo da má formulação da questão pela banca.

**Referências:**

BECHARA, E. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.  
 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 39. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2019.

<b>Situação</b>
Questão anulada

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7026		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	20	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

Na questão 20, lê-se “A dessecação de lavouras de soja para a realização da colheita tornou-se atividade rotineira em muitas regiões produtoras”. Em seguida, pede-se para marcar a alternativa INCORRETA, sendo esta a letra “b”. Todavia, a letra “a” também contém um erro. Nesta alternativa, lê-se “A dessecação visa uniformização da UMIDADE DOS GRÃOS E DA MATURAÇÃO DAS PLANTAS DA LAVOURA DA SOJA”.

No capítulo 14 do livro “Soja do Plantio à Colheita”, Câmara (2015) escreveu que o conceito de dessecação é dado como “A dessecação da soja é obtida pela pulverização de substâncias químicas, predominantemente da classe dos herbicidas não seletivos, que facilita a secagem, seguida ou não da queda das folhas, simultaneamente À PERDA DE UMIDADE DOS GRÃOS, preferencialmente sem reduzir o peso da matéria seca”. Mais a frente, o mesmo autor aborda “A dessecação NÃO deve ser uma PRÁTICA DE ROTINA, sendo indicada em SITUAÇÕES EXTREMAS, por exemplo, ... OU PARA UNIFORMIZAR PLANTAS DE SOJA COM MATURAÇÃO DESIGUAL...”.

Mesmo a dessecação sendo atualmente uma atividade rotineira, a uniformização da maturação ocorre em CONDIÇÕES EXTREMAS como citado por Câmara (2015). Na alternativa “a”, não há qualquer indício das condições em que a lavoura de soja está submetida. Sendo assim, o candidato que estudou o material e se preparou é prejudicado, pois aprendeu que a dessecação com foco na maturação é feita sob condições extremas. Portanto, ao ler a alternativa, ele concluirá que está incorreta. Diante disso, esta questão não foi bem formulada, porque contém duas alternativas que estão incorretas. Sendo assim, ela é passível de anulação.

**Referências:**

CÂMARA, G. M. de S. Colheita. In: SEDIYAMA, TUNEO; SILVA, FELIPE; BORÉM, ALUÍZIO (Ed.). Soja do plantio à colheita. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2015. 333 p.

SEDIYAMA, TUNEO; SILVA, FELIPE; BORÉM, ALUÍZIO (Ed.). Soja do plantio à colheita. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2015. 333 p.

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7036		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	8	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

A Banca Examinadora, Venho, respeitosamente, interpor recurso contra o gabarito da questão 8 que solicita a alternativa INCORRETA sobre adubação verde, a qual considerou como incorreta a afirmativa:

a) "As leguminosas para adubação verde reduzem as populações de nematoides."

Entretanto, tal afirmativa não pode ser considerada incorreta, pois encontra respaldo direto na literatura técnica. Conforme consta na introdução do capítulo 12 – "Adubos verdes para o controle de fitonematoides", da obra: LIMA FILHO, O.F.; AMBROSANO, E.J.; ROSSI, F.; CARLOS, J.A.D. (org.). Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: fundamentos e prática. Brasília, DF: Embrapa, 2014. v.1, tem-se:

"Alguns adubos verdes têm enorme potencial para serem usados no manejo de fitonematoides. Algumas espécies de adubos verdes, principalmente das famílias Fabaceae (Leguminosae) e Mimosaceae (Leguminosae), por serem não hospedeiras ou más hospedeiras dos nematoides-das-galhas (Meloidogyne spp.), foram extensivamente empregadas no seu manejo (...)."

O trecho evidencia que espécies de leguminosas utilizadas como adubos verdes atuam no manejo de nematoides, sobretudo por serem não hospedeiras ou más hospedeiras, implicando na redução de suas populações no solo.

Adicionalmente, a obra destaca a relevância do gênero Crotalaria:

"O gênero Crotalaria contém cerca de 550 espécies (...). As crotalárias são, sem dúvida, os adubos verdes mais estudados para o manejo dos nematoides (...)."

Ressalta-se ainda que diversas espécies de crotalária são descritas como más hospedeiras ou não hospedeiras de nematoides, reforçando seu papel no controle populacional.

Além disso, existem trabalhos com outras leguminosas, como a mucuna (Mucuna spp.), que evidenciam sua atuação no manejo de fitonematoides, ainda que com resultados variáveis. De forma resumida, a literatura aponta que: algumas mucunas apresentam baixa taxa de reprodução de nematoides (FR próximo ou inferior a 1), indicando baixa multiplicação; o número de massas de ovos nas raízes é significativamente menor quando comparado a culturas altamente suscetíveis; pode haver aumento populacional em determinadas condições, porém inferior ao observado em hospedeiros altamente suscetíveis; a incorporação da biomassa exerce papel fundamental na redução das populações de fitonematoides no solo, podendo compensar eventuais aumentos durante o cultivo.

Importa destacar, ainda, o conceito fitopatológico de resistência e tolerância de plantas aos fitonematoides: "Resistência refere-se à capacidade da planta de reduzir ou impedir a reprodução do nematoide, sendo comum em espécies não hospedeiras ou más hospedeiras, como diversas crotalárias. Tolerância refere-se à capacidade da planta de suportar a presença do nematoide sem apresentar perdas significativas, ainda que a população do patógeno possa se manter ou aumentar."

Nesse contexto, muitas leguminosas utilizadas como adubo verde apresentam comportamento de resistência, contribuindo diretamente para a redução populacional dos nematoides no solo, enquanto outras podem atuar indiretamente via manejo da biomassa.

Dessa forma, a literatura demonstra que leguminosas utilizadas como adubo verde podem reduzir ou manejar populações de nematoides, sendo essa uma generalização tecnicamente aceita.

Cabe destacar que a questão apresenta uma afirmativa generalista, e, nesse contexto, sua veracidade é sustentada pela literatura científica. A existência de variação entre espécies não invalida a afirmativa, mas apenas a qualifica.

Assim, a alternativa "a" não pode ser considerada incorreta, comprometendo o gabarito da questão.

Diante do exposto, solicito a revisão do gabarito, com a alteração da resposta ou anulação da questão, por apresentar inconsistência técnica.

At.te.

**Referências:**

INOMOTO, M. M.; ASMUS, G. L.; SILVA, R. A. da. Adubos verdes para o controle de fitonematoides. In: LIMA FILHO, O.F.; AMBROSANO, E.J.; ROSSI, F.; CARLOS, J.A.D. (org.). Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: fundamentos e prática. Brasília, DF: Embrapa, 2023. v.1.

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

RESPOSTA: A afirmação da alternativa tem uma generalização que não condiz com o conhecimento técnico-científico. Muitas espécies de adubação verde são altamente suscetíveis a nematoides (pg 469-470, Inomoto & Asmus, Adubos verdes das famílias Fabaceae e Momosaceae para o controle de fitonematoides. Cap 12 in: LIMA FILHO OF, AMBROSANO EJ, ROSSI F, CARLOS JAD, organizadores. Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: fundamentos e prática. Brasília, DF: Embrapa; 2014. v.1. 507p.) Portanto esta alternativa é incorreta. Diante disso, o gabarito oficial reflete o conhecimento técnico consolidado e está em sintonia com referência científica atualizada. Portanto, o gabarito oficial permanece.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7039		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	24	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

Recurso contra gabarito – questão 24.

Prezada banca examinadora,

Venho, respeitosamente, solicitar a revisão do gabarito da questão 24, que trata das medidas de controle do mofo-branco no feijoeiro, a qual considerou como incorreta a alternativa:

b) Ampliação do espaçamento entre fileiras para 0,70 m.

De acordo com Feijão do plantio à colheita, o manejo do mofo-branco deve ser realizado de forma integrada, incluindo práticas culturais que promovam: maior aeração do dossel, redução da umidade no interior da cultura, diminuição das condições favoráveis ao desenvolvimento do patógeno. Dentre essas práticas, destaca-se o ajuste do espaçamento e da densidade de plantas, visando reduzir o microclima favorável à doença.

A alternativa b menciona a ampliação do espaçamento entre fileiras, prática coerente com os princípios agrônômicos descritos na literatura. Embora o valor de 0,70 m não seja universalmente adotado, trata-se de um parâmetro possível dentro do manejo, variando conforme: cultivar, sistema de produção, condições ambientais

Portanto, não se trata de uma prática incorreta, mas sim de uma decisão técnica variável.

Ainda conforme a literatura, o controle do mofo-branco inclui também o uso de fungicidas como parte do manejo integrado

Diante do exposto, solicita-se: a anulação da questão, por apresentar ambiguidade técnica.

**Referências:**

CARNEIRO, J. E. S.; PAULA JUNIOR, T. J.; BOREM, A. Feijão do plantio à colheita. Viçosa, MG: Editora UFRV, 2015.

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7027		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	8	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

A Banca Examinadora, Venho, respeitosamente, interpor recurso contra o gabarito da Questão 08, que solicita a identificação da alternativa INCORRETA acerca da adubação verde.

“a) As leguminosas para adubação verde reduzem as populações de nematoides.”  
 é tecnicamente imprecisa, pois generaliza um efeito que é altamente dependente da espécie vegetal. O efeito das leguminosas sobre nematoides não é uniforme, variando conforme a espécie utilizada, o tipo de nematóide e as condições edafoclimáticas.

Essa afirmação apresenta uma generalização indevida, o que comprometeu sua avaliação e induziu ao erro. Segundo Ferraz e Brown (2016), em Nematologia de Plantas: Fundamentos e Importância, o comportamento das plantas frente aos nematoides é espécie-específico, podendo variar entre resistência, suscetibilidade ou efeito neutro. Adicionalmente, Primavesi (2016) ressalta que práticas de adubação verde devem ser avaliadas conforme as interações ecológicas específicas do sistema, não sendo possível generalizar seus efeitos sobre organismos do solo. Dessa forma, a assertiva “a” não contempla a variabilidade biológica entre espécies de leguminosas, configurando uma afirmação imprecisa. De acordo com Ferraz & Brown (2016), o efeito das plantas sobre nematoides varia conforme:

- espécie da leguminosa
- espécie do nematóide
- condições de solo e manejo

Algumas leguminosas (ex: Crotalaria spp.) são supressivas, enquanto outras podem ser hospedeiras, favorecendo a multiplicação do patógeno. Portanto, a afirmativa não é universalmente verdadeira. Algumas espécies de crotalária como *C. spectabilis*, *C. ochroleuca* e *C. juncea* são resistentes à maioria das populações de *M. javanica* (EMBRAPA, 2020), por exemplo. Ademais, segundo CRUZ et. al (2020), o cultivo de *Crotalaria spectabilis* e *C. ochroleuca* em sucessão à soja, como cultura de entressafra ou segunda safra, contribui para a redução da densidade populacional do nematóide das lesões radiculares (*Pratylenchus brachyurus*). Outras leguminosas para adubação verde podem não ter esse efeito de reduzir as populações de nematoides. Além disso, uma leguminosa pode ser resistente a um tipo de nematóide (ex: *Meloidogyne*) e hospedeira de outro (ex: *Pratylenchus*).

Além disso, a alternativa:

“d) As espécies do gênero *Crotalária* são suscetíveis ao complexo de fungos do solo.”  
 também pode gerar dúvida, pois a afirmação de que as espécies do gênero são susceptíveis ao completo de fungos do solo generaliza e desconsidera os níveis de susceptibilidade e indica que TODAS as espécies do gênero são susceptíveis a TODO o complexo de fungos do solo. A crotalária pode ser hospedeira de certos fungos e apresentar níveis variados de susceptibilidade a patógenos radiculares. Não há uma espécie amplamente resistente ou susceptível a TODO o complexo de fungos do solo; para uso, por exemplo, a escolha da espécie deve considerar o histórico de doenças da área. O gênero é, em geral, conhecido por ser hospedeiro alternativo e fonte de inóculo de diversos fungos fitopatogênicos (como *Fusarium*, *Rhizoctonia*, *Sclerotinia* e *Colletotrichum*), que podem causar doenças em culturas de sucessão, como a soja, o milho e o algodão. Embora sejam excelentes no manejo de nematoides, a alta densidade de plantio e a umidade podem favorecer fungos. A crotalária, quando usada como adubo verde, por exemplo, pode ajudar a suprimir o desenvolvimento de fungos patogênicos do solo. Essa ação é possível porque a crotalária contém compostos de enxofre, como glucosinolatos, que, quando incorporados ao solo, liberam isotiocianatos com propriedades biofumigantes, os quais, além de outros metabólitos secundários, como alcaloides pirrolizidínicos, flavonoides e compostos fenólicos, têm efeitos inibitórios sobre vários fungos patogênicos do solo, como *Fusarium*, *Rhizoctonia* e *Pythium* (Arone et. al, 2024)

Considerando que a questão solicita a alternativa INCORRETA, e que há mais de uma alternativa passível de questionamento técnico, solicita-se a anulação da questão, por apresentar ambiguidade e permitir dupla interpretação.

Termos em que,  
 Peço deferimento.

**Referências:**

FERRAZ, L.C.C.B.; BROWN, D.J.F. (Orgs.). Nematologia de plantas: fundamentos e importância, capítulo 10, 2016. Disponível em: [https://nematologia.com.br/files/livros/1.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://nematologia.com.br/files/livros/1.pdf?utm_source=chatgpt.com)

PRIMAVESI, Ana. Manejo ecológico do solo, 1982. Disponível em: <https://anamariaprimavesi.com.br/wp-content/uploads/2022/11/Manejo-Ecologico-del-Suelo.pdf>

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Reação de espécies de *Crotalaria* a diferentes populações de *Meloidogyne javanica*. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2020. (Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, n. 338). ISSN 1678-2518.

CRUZ, Thays Torquato; ASMUS, Guilherme Lafourcarde; GARCIA, Rodrigo Arroyo. Proteção de culturas. Ciência Rural, Santa Maria, v. 50, n. 7, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20190645>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cr/a/s4KMdRLvsjq4p9mWGVbQwtj/?lang=en>

ARONE, Gregorio J.; OCAÑA, Roger; SÁNCHEZ, Arcadio; VILLADAS, Pablo J.; FERNÁNDEZ-LÓPEZ, Manuel. Benefícios da *Crotalaria juncea* L. como adubo verde na fertilidade e nos microrganismos do solo no litoral peruano. *Microorganisms*, v. 12, n. 11, p. 2241, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/microorganisms12112241>  
PMID: 39597630. PMCID: PMC11596757. Acesso em: 14 abr. 2026.

**Situação**

Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7056		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	7	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

A Banca Examinadora, Venho, respeitosamente, interpor recurso contra o gabarito da Questão 07, que solicita a identificação da alternativa INCORRETA acerca do controle de plantas daninhas com a adubação verde.

A alternativa do gabarito "a) Os adubos verdes podem aumentar a presença de algumas espécies de plantas daninhas na área." foi colocada como resposta da questão, mas ela foi escrita de forma a induzir ao erro pois, embora o objetivo principal dos adubos verdes seja a supressão de plantas daninhas (por abafamento, alelopatia, etc.), sim, eles podem aumentar a presença de algumas espécies de plantas daninhas se não forem manejados corretamente. Esse aumento geralmente ocorre quando o adubo verde não se estabelece rápido o suficiente para competir. Algumas espécies de adubos verdes demoram a cobrir o solo, criando uma janela de tempo onde plantas invasoras de crescimento rápido podem se instalar. Se a planta de cobertura for roçada muito tarde, após produzir suas próprias sementes, ela mesma pode se tornar uma "planta daninha" no próximo cultivo, embora o risco maior seja o acúmulo de sementes da "erva daninha" que sobreviveu à palhada. Algumas plantas como *Mucuna aterrima* e *Crotalaria juncea* são muito eficientes na supressão por produzirem grande quantidade de biomassa rapidamente e a densidade de sementeira também influencia o fechamento (Silva et. al, 2013). Assim, a opção "a" foi escrita de forma muito generalista que pudesse induzir ao erro ao não considerar os fatores citados.

A alternativa "b) Os adubos verdes reduzem a biomassa de plantas daninhas, mas têm pouca influência sobre o banco de sementes destas no solo." também pode ser considerada incorreta, gerando ambiguidade na questão. Isso porque diversos estudos demonstram que o uso contínuo de adubos verdes pode, sim, reduzir o banco de sementes de plantas daninhas ao longo do tempo, seja por supressão da emergência, competição, alelopatia ou alteração das condições ambientais do solo. Isso indica que os adubos têm muita influência sobre o banco de sementes de plantas daninhas no solo. Por exemplo, no trabalho de Melander e colaboradores (2020), as leguminosas utilizadas como adubo verde durante todo o ano reduziram o banco de sementes de plantas daninhas em culturas subsequentes. A redução do banco de sementes de ervas daninhas pode chegar a 65% no momento da dessecação de uma cultura de adubação verde. O impacto residual no banco de sementes ainda é substancial três anos após o término do projeto. Então a opção b está incorreta também. Resultados similares vêm sendo demonstrados em trabalhos desde pelo menos 1996, como o de Teasdale (1996), Liebman e Davis (2000) e Severino e Christoffoleti (2001). Segundo eles, sistemas com plantas de cobertura e adubação verde podem promover redução significativa do banco de sementes de plantas daninhas, especialmente em manejos de médio e longo prazo. Essas plantas não reduzem apenas a emergência de plantas daninhas, mas também diminuem o aporte e a viabilidade de sementes no solo, especialmente em sistemas com manejo contínuo. Os mecanismos incluem:

- supressão da produção de sementes de plantas daninhas
- alelopatia
- alteração da dinâmica de germinação
- aumento da mortalidade de sementes no solo

Assim, afirmar que a influência sobre o banco de sementes é "pequena" constitui uma simplificação excessiva podendo induzir o candidato ao erro. Dessa forma, verifica-se que mais de uma alternativa pode ser interpretada como incorreta, o que compromete a objetividade da questão e pode induzir candidatos ao erro, ferindo o princípio da clareza e da unicidade de resposta.

Assim, solicita-se a anulação da questão, por apresentar ambiguidade e permitir dupla interpretação.

Termos em que,  
Peço deferimento.

**Referências:**

MELANDER, B.; RASMUSSEN, I. A.; OLESEN, J. E. Legacy effects of leguminous green manure crops on the weed seed bank in organic crop rotations. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, v. 302, p. 107078, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107078>. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107078>

SEVERINO, Francisco José; CHRISTOFFOLETI, Pedro Jacob. Banco de sementes de plantas daninhas em solo cultivado com adubos verdes. *Bragantia*, Campinas, v. 60, n. 3, p. 201–204, 2001.

TEASDALE, J. R. Contribution of cover crops to weed management in sustainable agricultural systems. *Journal of Production Agriculture*, v. 9, n. 4, p. 475–479, 1996. DOI: <https://doi.org/10.2134/jpa1996.0475>

LIEBMAN, M.; DAVIS, A. S. Integration of soil, crop and weed management in low-external-input farming systems. *Weed Research*, v. 40, n. 1, p. 27–47, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1046/j.1365-3180.2000.00164.x>

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7001		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	8	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

A questão 8 da prova pede para assinalar a alternativa INCORRETA sobre adubação verde. O gabarito informa que a resposta incorreta seria a letra a) "As leguminosas para adubação verde reduzem as populações de nematoides". No entanto, essa resposta não seria incorreta e sim correta. Apesar de nem todas as leguminosas utilizadas para adubação verde reduzirem populações de nematoides, algumas espécies são eficientes para essa finalidade. Os efeitos neste caso, mudam conforme as espécies ou grupos de nematoides, tornando essa opção correta. Dessa forma, todas as alternativas apresentadas na questão número 8 seriam corretas e não se encaixariam no que foi solicitado pela questão.

**Referências:**

Sharma, R. D.; Pereira, J.; Resck, D. V. S. Eficiência de adubos verdes no controle de nematoides associados a soja nos Cerrados. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, CPAC, Boletim de pesquisa 13, 1982, 30 p. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/547165/1/bolpd13.pdf>

Alves, L. E. S. G; Fontana, L. F.; Dias-Arieira, C. R. Green manure and Pochonia chlamydosporia for Meloidogyne javanica control in soybean. Revista Caatinga, v. 35, n. 3, p. 625 - 632, 2022. <http://doi.org/10.1590/1983-21252022v35n313rc>

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

O gabarito informa que a resposta incorreta seria a letra a) "As leguminosas para adubação verde reduzem as populações de nematoides". No entanto, essa resposta não seria incorreta e sim correta. Apesar de nem todas as leguminosas utilizadas para adubação verde reduzirem populações de nematoides, algumas espécies são eficientes para essa finalidade. Os efeitos neste caso, mudam conforme as espécies ou grupos de nematoides, tornando essa opção correta. Dessa forma, todas as alternativas apresentadas na questão número 8 seriam corretas e não se encaixariam no que foi solicitado pela questão. RESPOSTA: A afirmação da alternativa tem uma generalização que não condiz com o conhecimento técnico-científico. Muitas espécies de adubação verde são altamente suscetíveis a nematoides (pg 469-470, Inomoto & Asmus, Adubos verdes das famílias Fabaceae e Momosaceae para o controle de fitonematoides. Cap 12 in: LIMA FILHO OF, AMBROSANO EJ, ROSSI F, CARLOS JAD, organizadores. Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: fundamentos e prática. Brasília, DF: Embrapa; 2014. v.1. 507p.) Portanto esta alternativa é incorreta. Diante disso, o gabarito oficial reflete o conhecimento técnico consolidado e está em sintonia com referência científica atualizada. Portanto, o gabarito oficial permanece.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7002		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	19	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

A questão 19 da prova pede para informar quais afirmações seriam corretas quanto as alternativas de manejo no controle de áreas infestadas com nematoide-de-cisto-da-soja. I. Rotação de culturas com espécies não hospedeiras, como o milho; II. Uso de cultivares resistentes e III. Eliminar restos culturais infectados. O gabarito informa que a resposta seria a letra a) "I e II apenas". No entanto, a afirmação III também seria correta. A eliminação de restos culturais também é uma medida adotada no manejo dessa espécie de nematoide para diminuir a sobrevivência e dispersão de cistos, conforme relatado pela Embrapa Soja, que recomenda a eliminação de plantas em áreas infestadas, incluindo plantas daninhas hospedeiras. Dessa forma, todas as alternativas apresentadas na questão número 19 seriam corretas e se encaixam no que foi solicitado pela questão. A resposta correta seria a letra d) I, II e III.

**Referências:**

Silva, J. F. V. Nematoide de cisto da soja - É hora de prevenir. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Centro Nacional de Pesquisa de Soja - Embrapa, CNPSo, 1995. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/445143/1/ID1769.pdf>

Yorinori, J. T. Galerani, P. R. Garcia, A. Manejo da cultura para controle do nematoide de cisto da soja. Londrina, PR. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Centro Nacional de Pesquisa de Soja - Embrapa, CNPSo, Documentos 83, 1994. 26 p. Disponível em: <https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/445794/manejo-da-cultura-para-controle-do-nematoide-de-cisto-da-soja>

**Situação**

Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7029		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	27	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

A questão 27 da prova pede para classificar as cultivares de milho quanto a homogeneidade e produtividade, em ordem crescente, sendo a descrição apresentada em: (1) Híbridos simples; (2) Híbridos triplos; (3) Híbridos duplos; e (4) Variedades. O gabarito informa que a resposta seria a letra c) "1, 2, 3, 4", classificando do mais produtivo para o menos produtivo, o que gera ambiguidade e inconsistência. A classificação correta seria do maior para o menor 4, 3, 2, 1, tendo em vista que a questão pede a ordem crescente de homogeneidade (1º) e produtividade (2º). Considerando que foram apresentados dois fatores (homogeneidade e produtividade) e a questão também não está especificando a ordem de classificação desses fatores de forma clara, neste caso, a resposta poderia ser tanto a letra b) "4, 3, 2, 1", como a letra c) "1, 2, 3, 4". As cultivares híbridas apresentam maior homogeneidade, produtividade e desempenho devido a presença de heterose, que resulta em produção mais uniforme, quando comparadas as variedades, que possuem maior variabilidade genética e conseqüentemente, menor uniformidade. Nessa classificação, os híbridos simples apresentariam maior uniformidade genética e produtividade, os triplos e duplos, desempenho intermediário e as variedades maior variabilidade e menor uniformidade (homogeneidade) e produtividade. Por este motivo, a ordem crescente considerando a capacidade de uniformização e rendimento, começaria do maior número para o menor número 4, 3, 2, 1. A questão leva a duas interpretações diferentes em termos de gabarito.

**Referências:**

Emygdio, B. M.; Ignaczak, J. C.; Cargnelutti Filho, A. Potencial de rendimento de grãos de híbridos comerciais simples, triplos e duplos de milho. *International Journal of Maize & Sorghum*, v. 6, n. 1, p. 95-103, 2007. <https://doi.org/10.18512/1980-6477/rbms.v6n01p%p>

Bernini, C. S.; Paterniani, M. E. A. G. Z. Estimativas de parâmetros de heterose em híbridos de populações F2 de milho. *Pesquisa Agropecuária Tropical*, v. 42, n. 1, p. 56-62, 2012. <https://doi.org/10.1590/S1983-40632012000100008>

<b>Situação</b>
Mudança de gabarito

**Análise:**

A questão 27 deverá ter o Gabarito Oficial alterado, onde se lê "C", leia-se "B". Segue a questão: "As cultivares de milho são classificadas em: (1) Híbridos simples; (2) Híbridos triplos; (3) Híbridos duplos; e (4) Variedades. Assinale a alternativa que classifica essas cultivares quanto à maior homogeneidade das plantas e maior produtividade, em ordem crescente:" A resposta correta é letra B (4, 3, 2 e 1) e não letra C (1, 2, 3 e 4) conforme divulgado no Gabarito Oficial. Assim a banca examinadora solicitou a alteração do Gabarito Oficial publicado.

## Relatório de Recursos Contra Prova

Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7045		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	12	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

A questão 12 da prova pede para assinalar a alternativa CORRETA sobre o cultivo de batata destinada ao processamento industrial para fritura. O gabarito informa que a resposta correta seria a letra c) "obtenção de tubérculos com alta gravidade específica exige que o ciclo de cultivo da batateira no campo seja o mais longo possível". A afirmação absoluta de que o ciclo da batateira no campo precisa ser o mais longo possível é inconsistente e indevida. Isto porque, o tempo de cultivo também é influenciado pela cultivar, ambiente e condições de manejo no campo. Ciclos mais longos, também demandam maiores insumos e gastos econômicos ao produtor. O plantio de batata para fritura de ciclo precoce (ou ciclo curto), já é uma prática realizada, tendo em vista as altas demandas produtivas da atualidade. Além disso, cultivares de ciclo mais longo, ou ciclo precoce, também podem apresentar comportamentos distintos conforme a região de cultivo. Dessa forma a afirmação apresentada é inapropriada e a questão não possui uma alternativa adequada.

**Referências:**

Rodrigues, G. B.; Pinto, C. A. B. P.; Benites, F. R. G.; Melo, D. S. Seleção para duração do ciclo vegetativo em batata e relação com a produtividade de tubérculos. Horticultura Brasileira, v. 27, n. 3, p. 280-285, 2009. <https://doi.org/10.1590/S0102-05362009000300003>

Silva, G. O.; Pereira, A. S.; Carvalho, A. D. F. Seleção de clones de batata para fritura com base em índices de seleção. Revista Ceres, v. 61, n. 6, p. 941-947 2014. <https://doi.org/10.1590/0034-737X201461060008>

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7051		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	14	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

Prezada banca avaliadora,  
Venho gentilmente solicitar a anulação da questão, em razão de inconsistência técnica na alternativa apontada como correta (letra D).

A alternativa D afirma que “a poda da haste principal é uma prática recomendada para acelerar a brotação dos caules laterais e antecipar a colheita”. Embora a poda apical possa, de fato, estimular a emissão de brotações laterais pela quebra da dominância apical, a afirmação de que essa prática resulta em antecipação da colheita não pode ser considerada uma recomendação técnica generalizada.

De acordo com a literatura clássica da olericultura, como descrito por Figueira (2007), a precocidade da produção em hortaliças é determinada por um conjunto de fatores, incluindo características genéticas da cultivar, condições ambientais (temperatura, radiação), manejo nutricional, disponibilidade hídrica e sistema de condução adotado. Dessa forma, não há respaldo para estabelecer uma relação direta e universal entre a poda da haste principal e a antecipação da colheita no meloeiro.

Além disso, o enunciado não especifica o sistema de condução (uma haste, duas hastes ou condução em ramos laterais), o que é determinante para a adoção ou não dessa prática e seus efeitos sobre a produção. Essa ausência de contextualização compromete a objetividade da questão.

Assim, a alternativa D incorre em generalização indevida ao associar diretamente a poda da haste principal à antecipação da colheita, não sendo possível considerá-la inequivocamente correta.

Diante do exposto, solicito gentilmente, a anulação da questão por ausência de alternativa plenamente correta.

**Referências:**

FILGUEIRA, F.A.R. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças. 3ª ed. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2007. 421p

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7037		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	19	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

Solicito a revisão do gabarito da questão, tendo em vista que a alternativa considerada correta desconsidera uma prática válida dentro do manejo do nematoide-de-cisto da soja.

A afirmativa III menciona a eliminação de restos culturais infectados como medida de controle. Essa prática deve ser interpretada dentro do contexto das medidas de exclusão e manejo integrado de fitonematoides, sendo tecnicamente válida.

De acordo com o conteúdo programático, no tópico Nematoide de Cisto:

Soja: do plantio à colheita (pág. 301)

"Medidas de exclusão, ou seja, aquelas que evitam a entrada do patógeno na área, são extremamente importantes para que não ocorram problemas com fitonematoides, sendo válidas para todas as espécies discutidas nesse capítulo."

Nesse contexto, a eliminação de restos culturais infectados é uma medida de exclusão do patógeno e, portanto, devendo ser considerada uma prática eficaz para o controle do nematoide, conforme a passagem do livro apresentada.

Embora o Nematoide-de-cisto-da-soja sobreviva principalmente na forma de cistos no solo, a literatura reconhece que o manejo deve ser realizado de forma integrada, incluindo práticas que reduzam sua disseminação e permanência no ambiente.

Assim, a afirmativa III não pode ser considerada incorreta, pois representa uma prática coerente com os princípios de manejo e exclusão de fitonematoides.

Diante do exposto, solicita-se: Alteração do gabarito para letra D (I, II e III).

**Referências:**

SEDIYAMA, TUNEO; SILVA, FELIPE; BOREM, ALUIZIO (Ed.). Soja do plantio à colheita. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2015. 333 p.

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7038		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	7	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

Solicito a revisão do gabarito da questão, tendo em vista que a alternativa considerada incorreta apresenta ambiguidade técnica, especialmente quanto ao tempo de avaliação dos efeitos da adubação verde sobre o banco de sementes de plantas daninhas. A alternativa B afirma que a adubação verde “tem pouca influência sobre o banco de sementes”. Entretanto, essa afirmação não pode ser considerada incorreta, pois depende da escala temporal considerada (curto ou longo prazo). De acordo com a literatura científica, os efeitos da adubação verde ocorrem em diferentes escalas:

- Curto prazo: predominam efeitos de supressão da emergência e redução da biomassa de plantas daninhas, principalmente por competição e cobertura do solo.
- Longo prazo: há redução progressiva do banco de sementes, decorrente da menor produção de sementes e da limitação da emergência ao longo dos ciclos agrícolas.

Esse comportamento é descrito no estudo: ZHANG, X. et al. Cover crops for weed management: a global synthesis. Journal of Integrative Agriculture, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jia.2024.01.007>

O artigo demonstra que o uso contínuo de plantas de cobertura (adubação verde) promove redução do banco de sementes ao longo do tempo, indicando que esse efeito é cumulativo e dependente do manejo continuado, não sendo imediato. Dessa forma, a afirmativa da alternativa B torna-se incorreta, pois não especifica o período de análise, podendo ser interpretada como correta sob a ótica de curto prazo e incorreta sob a ótica de longo prazo. Adicionalmente, a alternativa A também apresenta caráter generalista ao afirmar que adubos verdes podem aumentar a presença de plantas daninhas, o que não representa o comportamento predominante da prática, sendo dependente de condições específicas. Diante da inexistência de alternativa correta, solicita-se: anulação da questão

**Referências:**

ZHANG, X. et al. Cover crops for weed management: a global synthesis. Journal of Integrative Agriculture, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jia.2024.01.007>

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7040		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	12	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

Solicito a revisão do gabarito da questão, tendo em vista que a alternativa considerada correta apresenta generalização indevida e caráter absoluto, incompatível com o conhecimento técnico da cultura.

A alternativa C afirma que a obtenção de tubérculos com alta gravidade específica “exige” que o ciclo de cultivo da batateira no campo seja o mais longo possível.

Entretanto, a qualidade industrial da batata, especialmente o teor de matéria seca e a gravidade específica, é resultado da interação de múltiplos fatores, tais como:

- cultivar
- manejo nutricional
- condições edafoclimáticas
- manejo da irrigação
- época de colheita

Dessa forma, o prolongamento do ciclo não constitui uma exigência obrigatória, mas sim um dos fatores possíveis dentro do manejo, não podendo ser tratado como condição determinante isolada.

Estudos científicos demonstram que a qualidade dos tubérculos e os atributos industriais são influenciados por diversos fatores e pelo manejo adotado, não sendo dependentes exclusivamente da duração do ciclo da cultura. Nesse sentido:

O estudo de Cardoso et al. (2017) evidencia que o teor de matéria seca e a qualidade industrial são fortemente influenciados pelo manejo nutricional, especialmente pelo nitrogênio, demonstrando que o ciclo não é o único fator determinante.

Além disso, o trabalho de Leão (2013) reforça que atributos como matéria seca, qualidade para fritura e rendimento industrial estão associados a fatores genéticos e de manejo, evidenciando o caráter multifatorial da qualidade dos tubérculos

Dessa forma, a afirmativa da alternativa C torna-se incorreta, por utilizar o termo “exige”, que implica obrigatoriedade, o que não condiz com o conhecimento agrônomo atual.

Diante do exposto, solicita-se: anulação da questão.

**Referências:**

CARDOSO, Adriana Dias; ALVARENGA, Marco Antônio Rezende; MELO, Thiago Lima; VIANA, Anselmo Eloy Silveira. Qualidade de tubérculos de batata em função de doses de nitrogênio. Horticultura Brasileira, v. 35, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-053620170321>

LEÃO, Armindo Bezerra. Produtividade de tubérculos e índices de nitrogênio em plantas de batata influenciados por fontes e doses de nitrogênio. 2013. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) — Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG. Disponível em: <https://locus.ufv.br/server/api/core/bitstreams/0ca628d2-c145-48a6-b018-8dca6178a059/content>

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
6994		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	27	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

A questão solicita a classificação das cultivares de milho quanto à maior homogeneidade das plantas e maior produtividade, em ordem crescente. De acordo com os princípios de melhoramento genético vegetal, a ordem crescente de homogeneidade e produtividade das cultivares de milho é: Variedades < Híbridos duplos < Híbridos triplos < Híbridos simples, ou seja: 4, 3, 2, 1. As variedades apresentam maior variabilidade genética e menor produtividade, enquanto os híbridos simples apresentam maior uniformidade e maior expressão de heterose, resultando em maior produtividade. Dessa forma, a alternativa que representa corretamente essa ordem é a letra \*(b) 4, 3, 2, 1\*. Entretanto, o gabarito preliminar aponta como correta a alternativa \*(c) 1, 2, 3, 4\*, que corresponde à ordem inversa (decrecente), contrariando o enunciado da questão. Diante do exposto, solicita-se a \*alteração do gabarito de (c) para (b)\*

Recurso – Questão 23

A alternativa indicada como correta afirma que “em algumas situações, o uso de calcário pode ser suficiente para corrigir a deficiência de molibdênio”. No entanto, a redação é imprecisa, pois pode levar ao entendimento de que o calcário atua como fonte de molibdênio, o que não é correto. O calcário não fornece molibdênio; seu efeito é indireto, ao elevar o pH do solo e aumentar a disponibilidade do nutriente já presente. A ausência dessa explicação compromete a clareza da alternativa e permite dupla interpretação. Dessa forma, solicita-se a anulação da questão por imprecisão conceitual.

**Referências:**

Questão 27- Página 144 do livro Milho do plantio a colheita- 2 edição, referência de estudos do edital  
 Questão 23- Problemas de dupla interpretação em uma das alternativas.

<b>Situação</b>
Inválido

**Análise:**

Ainda não avaliado

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7000		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	27	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

A Banca Examinadora,

Venho, respeitosamente, interpor recurso contra a questão 27 do concurso, que aborda a ordem crescente de homogeneidade e produtividade entre tipos de cultivares de milho. O documento em PDF intitulado "Recurso" apresenta o detalhamento completo da fundamentação, sendo o conteúdo aqui exposto correspondente à sua reprodução na seção de justificativa. De acordo com a 2ª edição do livro "Milho: do plantio à colheita" (Documento Figura 1.jpg), fornecido no edital do presente concurso, a homogeneidade e produtividade aumenta da seguinte forma: Variedade (4) < HD (3) < HT (2) < HS (1), resultando na opção b) 4, 3, 2, 1. Entretanto, o gabarito da questão 27 é a opção c) 1, 2, 3, 4, o que estaria afirmando erroneamente que variedade, híbridos duplos e híbridos triplos são mais produtivos e uniformes geneticamente que os híbridos simples.

Observando a seta superior da imagem (Documento "Figura 1.jpg), que representa homogeneidade e produtividade, verifica-se a seguinte sequência: Variedade (4) < HD (3) < HT (2) < HS (1), confirmando a alternativa b). Isso se justifica pelos seguintes fundamentos:

Os híbridos simples (HS) apresentam maior potencial produtivo e uniformidade genética.

Os híbridos duplos (HD) se originam do cruzamento entre HS e possuem menor produtividade e homogeneidade em relação a estes.

E os híbridos triplos (HT) resultam do cruzamento entre um híbrido simples e híbrido duplo, apresentando desempenho intermediário a HS e HD.

As variedades, também chamadas de cultivares de polinização aberta, se originam a partir de livre polinização. Por isso são altamente heterogêneas e apresentam menor produtividade que os híbridos.

Dessa forma, a sequência apresentada pela questão encontra-se invertida em relação ao conhecimento técnico consolidado, caracterizando erro conceitual. Diante do exposto, solicita-se a anulação da questão, por apresentar gabarito inconsistente com a literatura fornecida no edital.

Termos em que,  
Pede deferimento.

**Referências:**

BOREM, A.; GALVAO, J.C.C.; PIMENTEL, M.A.G. (Ed.). Milho: do plantio à colheita. 2. ed. atual. e ampl. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2017. 382 p.

<b>Situação</b>
Mudança de gabarito

**Análise:**

A questão 27 deverá ter o Gabarito Oficial alterado, onde se lê "C", leia-se "B". Segue a questão: "As cultivares de milho são classificadas em: (1) Híbridos simples; (2) Híbridos triplos; (3) Híbridos duplos; e (4) Variedades. Assinale a alternativa que classifica essas cultivares quanto à maior homogeneidade das plantas e maior produtividade, em ordem crescente." A resposta correta é letra B (4, 3, 2 e 1) e não letra C (1, 2, 3 e 4) conforme divulgado no Gabarito Oficial. Assim a banca examinadora solicitou a alteração do Gabarito Oficial publicado.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7046		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	2	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

Questão 02 – Solicitação de anulação

A alternativa apontada como correta (letra A) está de acordo com a literatura ao considerar o escoamento do ar frio em áreas inclinadas. Contudo, a alternativa C não pode ser considerada incorreta de forma inequívoca.

O uso de barreiras vegetais (quebra-ventos) é uma prática reconhecida por alterar o microclima agrícola, reduzindo a velocidade do vento e influenciando o balanço de energia térmica, podendo contribuir para a mitigação de danos causados por geadas em determinadas condições.

Segundo Agrometeorologia: fundamentos e aplicações práticas, fatores como vento e trocas de calor são determinantes na ocorrência de geadas. Adicionalmente, publicações da EMBRAPA destacam que barreiras vegetais modificam o microclima, interferindo na dinâmica térmica das áreas cultivadas.

Dessa forma, há margem para interpretação de que mais de uma alternativa possa ser considerada correta.

Diante do exposto, solicita-se a anulação da questão.

**Referências:**

<https://pt.scribd.com/document/517527747/Pereira-Et-Al-2002-Agrometeorologia-Fundamentos-e-Aplicacoes-Praticas-OCRrc>

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7047		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	8	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

Questão 08 – Solicitação de alteração de gabarito ou anulação

O gabarito preliminar aponta a alternativa A como incorreta. Entretanto, a assertiva apresenta generalização que compromete sua classificação como falsa.

A afirmação de que leguminosas utilizadas como adubo verde reduzem populações de nematoides não pode ser considerada universal, porém há respaldo técnico de que diversas espécies exercem efeito supressivo, como as do gênero *Crotalaria*, amplamente utilizadas no manejo de nematoides.

De acordo com publicações da EMBRAPA, espécies de adubos verdes, especialmente leguminosas como *Crotalaria* spp., podem reduzir populações de nematoides em sistemas agrícolas. Adicionalmente, Adubação Verde e Plantas de Cobertura no Brasil: Fundamentos e Prática descreve o uso dessas espécies na supressão de fitonematoides.

Dessa forma, a assertiva A pode ser considerada verdadeira em termos gerais, ainda que não se aplique a todas as espécies, não sendo claramente incorreta.

Por outro lado, a alternativa D apresenta imprecisão ao generalizar a suscetibilidade de espécies do gênero *Crotalaria* a fungos de solo, característica que varia conforme espécie e patógeno.

Assim, a questão apresenta ambiguidade e possibilidade de múltiplas interpretações.

Diante do exposto, solicita-se a alteração do gabarito ou, alternativamente, a anulação da questão.

**Referências:**

<https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1153241/adubacao-verde-e-plantas-de-cobertura-no-brasil-fundamentos-e-pratica-volume-1>

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7048		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	12	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

Questão 12 – Solicitação de anulação

O gabarito preliminar indica a alternativa C como correta. Entretanto, a assertiva apresenta imprecisão conceitual ao afirmar que a obtenção de tubérculos com alta gravidade específica “exige” que o ciclo da cultura seja o mais longo possível.

A gravidade específica da batata está relacionada ao teor de matéria seca, sendo influenciada por diversos fatores, como cultivar, manejo nutricional, condições ambientais e estágio de colheita, não dependendo exclusivamente da duração máxima do ciclo.

De acordo com a EMBRAPA, a qualidade industrial da batata para fritura resulta da interação entre genética e manejo, sendo possível obter tubérculos com alta matéria seca sem que o ciclo seja necessariamente o mais longo possível.

Adicionalmente, destaca que o ponto de colheita ideal depende do equilíbrio entre matéria seca e qualidade, não sendo recomendado generalizar que ciclos mais longos sejam sempre necessários.

Dessa forma, o uso do termo “exige” torna a alternativa C tecnicamente questionável, caracterizando generalização indevida.

Diante do exposto, solicita-se a anulação da questão.

**Referências:**

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1028425/1/SistemadeProducaodaBatata.pdf

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Resposta em anexo.

## Relatório de Recursos Contra Prova

### Edital 06/2026/PGP - Concurso Público para cargos Técnico-

<b>Protocolo</b>		<b>Nome</b>	
7049		*****	
<b>Campus</b>		<b>CPF</b>	<b>Passaporte</b>
Campus Viçosa		*****	*****
<b>Cargo / Curso</b>			
Técnico em Agropecuária/Agronomia			
<b>Gabarito</b>	<b>Questão</b>	<b>Prova</b>	
1	18	Prova Objetiva de Técnico em Agropecuária / Agronomia	

**Justificativa:**

Questão 18 – Solicitação de anulação

O gabarito preliminar aponta a alternativa C como correta. Entretanto, a alternativa A merece consideração, tendo em vista a atual situação do manejo da ferrugem-asiática da soja.

Embora fungicidas do grupo dos triazóis tenham sido amplamente utilizados no controle de *Phakopsora pachyrhizi*, diversos estudos relatam redução de eficiência desses produtos em função do desenvolvimento de resistência do patógeno.

Segundo a EMBRAPA, o manejo da ferrugem-asiática deve priorizar o uso de misturas de fungicidas e estratégias integradas, sendo os triazóis isolados considerados de eficiência limitada em muitas situações.

"A pesquisadora informa que foram avaliados fungicidas dos grupos dos triazóis, estrobilurina, carboxanilida isolados ou em misturas. "Devido a menor eficiência observada com os fungicidas do grupo dos triazóis, a partir da safra 2009/10, passamos a indicar somente a utilização de misturas comerciais de triazóis com estrobilurinas para o controle da ferrugem, o que comprávamos também na última safra", diz. - referencia 1 em anexo  
 "Na safra de soja 2007/2008 alguns produtores tiveram dificuldades para controlar a ferrugem asiática com alguns fungicidas do grupo químico dos triazóis.. - referencia 2 em anexo"

Dessa forma, a simples indicação de "fungicidas do grupo dos triazóis" como prática de manejo pode ser considerada imprecisa frente ao atual conhecimento técnico.

Assim, a questão apresenta margem para interpretação.

Diante do exposto, solicita-se a anulação da questão.

**Referências:**

- 1- <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/18150334/rede-avalia-eficiencia-de-fungicidas-para-controle-da-ferrugem-da-soja-e-mofo-branco>
- 2 - [https://www.agrolink.com.br/noticias/julho--uso-de-fungicidas-triazois-pra-controle-da-ferrugem-asiatica\\_72255.html](https://www.agrolink.com.br/noticias/julho--uso-de-fungicidas-triazois-pra-controle-da-ferrugem-asiatica_72255.html)

<b>Situação</b>
Questão mantida

**Análise:**

Conforme a literatura sugerida como base para o Concurso Público sob Edital 06/2026, publicado no DOU em 19/02/2026, Sediya et al. (2015), na página 291, que se trata de métodos utilizados no controle da ferrugem asiática, causada pelo fungo *Phakopsora pachyrhizi*, lê-se: "A aplicação de fungicidas tem sido um dos métodos mais utilizados no controle da doença, principalmente incluindo produtos dos grupos dos triazóis, estrobilurinas e benzimidazóis". Diante da transcrição, entende-se que a solicitação do(a) candidato(a) de anulação da questão, está INDEFERIDA. SEDIYAMA, TUNEO; SILVA, FELIPE; BORÉM, ALÚZIO (Ed.). Soja do plantio à colheita. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2015. 333 p.